

Olama V.

RÉGION b.-f.

DU

SPECTRE SOLAIRE

1.3

RÉGION b.-f.

DU

SPECTRE SOLAIRE

DESSINÉE

PAR LE CHANOINE EUG. SPÉE

Docteur en sciences,

Astronome à l'Oservatoire royal de Belgique

TEXTE

BRUXELLES
POLLEUNIS & CEUTERICK, IMPRIMEURS

1899

37, RUE DES URSULINES, 37



		-	
			J.

Cette **RÉGION b-f. DU SPECTRE SOLAIRE** fait suite au célèbre **SPECTRE SOLAIRE** exécuté par Thollon.

Le savant et regretté spectroscopiste français ne put achever son grand travail. La maladie qui devait bientôt avoir une fatale issue, l'arrêta, alors qu'il était parvenu dans la région verte au groupe b du Magnésium. Heureusement le dessin de la région étudiée, qui comprend environ la moitié du spectre visible, pouvait être considéré comme terminé et M. Perrotin, Directeur de l'observatoire de Nice, entre les mains duquel Thollon l'avait confié, se chargea de le faire paraître. La reproduction qu'en a donnée la maison Gautier-Villars de Paris est aussi fidèle qu'artistique.

Malgré le danger qu'il y avait d'échouer dans la continuation d'une œuvre accomplie avec la plus grande perfection, j'osai l'entreprendre, après avoir obtenu l'entier consentement de M. Perrotin. Mais j'eus bientôt constaté que le spectroscope de notre Observatoire Royal était insuffisant, et que pour travailler avec quelques chances de succès, le puissant instrument dont Thollon s'était servi et qu'il avait lui-même inventé, était indispensable.

Grâce à l'auguste intervention d'une Altesse Royale, pour laquelle je conserve une très respectueuse et très vive reconnaissance, je fus admis à l'observatoire de Nice où M. Perrotin voulut bien m'accueillir de la façon la plus cordiale et la plus hospitalière. Durant les deux séjours prolongés que je fis dans ce magnifique établissement, que la ville de Nice doit à la munificence de M. Raphael Bischoffsheim, il n'épargna rien pour me faciliter l'accomplissement de la tâche que je m'étais imposée.

En 1891, j'étudiai la région spectrale comprise entre la raie $\lambda = 5166.464$ la dernière du spectre de Thollon et la raie F ($\lambda = 4861.527$) et en 1892 celle qui s'étend de F à f ($\lambda = 4383.720$).

Les circonstances ne m'ayant pas permis d'exécuter sur place le dessin, ce fut à l'observatoire d'Uccle que je m'occupai de la confection des planches, à l'aide des mesures relevées dans les conditions qui seront exposées plus bas. Mais malgré tout le soin apporté à la rédaction des notes et dans les calculs de réduction, il y avait à craindre que quelques erreurs ne se fussent glissées dans les résultats, et je jugeai que ce dessin devait nécessairement être comparé avec l'original avant de pouvoir être considéré comme définitif. Malheureusement, lorsque j'en fis la demande en 1893 à M. Perrotin, le spectroscope de Nice ne pouvait plus être mis à ma disposition. Je savais d'ailleurs que l'observatoire d'Alger, situé sur les hauteurs de la Bouzareah, possédait un appareil semblable sorti des mains du même constructeur. Je sollicitai et obtins l'autorisation de m'y rendre. J'y retrouvai dans la personne de son savant Directeur, M. Trépied, cette même amabilité intelligente que j'avais rencontrée chez M. Perrotin. Lui aussi daigna se dépenser de toutes manières pour me venir en aide. Après une vérification minutieuse, qui me demanda près de quatre mois, je me décidai à faire un nouveau dessin qui est celui contenu dans l'atlas joint à ce mémoire.

Dans le cours de l'exécution de ce long et souvent pénible travail, j'eus à vaincre des difficultés nombreuses. Mais dès ses débuts je me suis vu l'objet de la sollicitude la plus active et la plus dévouée. Elle ne m'a jamais fait défaut et c'est à elle principalement, que je dois d'avoir pu terminer mon œuvre. Il me faut ajouter que si je puis la publier aujourd'hui, c'est parce qu'après son achèvement j'ai reçu le plus libéral concours.

Que mes très nobles et très généreux protecteurs me permettent de leur présenter encore ici, la plus respectueuse expression de ma profonde et inaltérable gratitude.

Le chanoine Eug. Spée.

Uccle, Décembre 1898.

Le **NOUVEAU DESSIN DU SPECTRE SOLAIRE** exécuté par Thollon et publié dans le tome III des *Annales de l'Observatoire de Nice*, est incontestablement l'œuvre la plus parfaite de toutes celles qui ont successivement paru sur ce sujet important. Seule elle suffirait à montrer le haut degré de perfection auquel sont parvenus les instruments et les méthodes employés dans l'analyse spectrale.


Thollon était un savant doublé d'un artiste Aimant avec passion cette partie de la science à laquelle il s'était consacré tout entier, il possédait pour la servir les qualités les plus éminentes Connaissant à fond les théories de l'optique, il sut en faire les applications les plus heureuses et les plus fécondes. Observateur d'une rare précision et doué d'une habileté de main remarquable, il put reproduire le résultat de ses observations avec la plus fidèle exactitude. Son activité, qu'une santé absolument délabrée ne parvint pas à ralentir, lui permit d'exécuter des travaux de la plus grande valeur et qui l'ont rangé parmi les spectroscopistes les plus distingués de l'époque.

Frappé, ainsi qu'il le dit lui-même, des lacunes que présentaient les spectres publiés par ses prédécesseurs et ses contemporains, et convaincu de l'importance et de l'utilité d'une bonne carte solaire, Thollon avait conçu le grand projet de faire en faveur des études spectrales du soleil, ce qu'Argelander avait réalisé pour l'étude du Ciel, c'est-à-dire, de dessiner un spectre étalon où toutes les lignes, par l'exactitude de leurs positions et la fidélité dans la reproduction de leurs caractères extérieurs, constitueraient autant de données sûres, dans lesquelles tous ceux qui s'occupent d'astrophysique pourraient avoir la plus grande confiance.

De son temps, des progrès très remarquables, exigés d'ailleurs par l'importance sans cesse grandissante de cette branche nouvelle des sciences d'observation, avaient été réalisés dans la construction des spectroscopes prismatiques. Bunsen et Kirchhoff, dans le but d'augmenter la dispersion, avaient multiplié le nombre des prismes. Duboscq, cherchant à simplifier et à diminuer le volume de l'instrument, était arrivé à doubler l'action réfringente en faisant réfléchir le rayon dispersé sur une des faces du prisme préalablement argentée, et Grupp avait appliqué ce principe dans la construction d'un puissant appareil composé de six

prismes disposés en couronne. Les grands avantages que présentent les prismes à vision directe trouvés par Amici, notamment celui de pouvoir employer entre les crowns des flints excessivement lourds, qui sans cette disposition s'altèreraient à l'air, les avaient fait rapidement adopter. Enfin d'habiles constructeurs, à la tête desquels il convient de citer Browning de Londres, étaient parvenus, à l'aide d'ingénieux dispositifs mécaniques, à mettre à la fois tous les prismes dans la position indispensable du minimum de déviation, quelle que fût la région observée.

Thollon tira parti de tous ces perfectionnements et il réussit à constituer un appareil dont les résultats, du moins pour la partie la plus lumineuse du spectre, peuvent soutenir la comparaison avec les meilleurs donnés par les grands réseaux américains.



Son spectroscope, dont je reproduis ci-dessus la figure, est polyprismatique et les prismes sont du genre dit composé, employés antérieurement déjà par Young et Grubb. Ils diffèrent des prismes à vision directe, en ce que l'angle réfingent du prisme total est du même côté que l'angle réfringent du flint, au lieu de lui être opposé. Cette disposition permet d'augmenter l'angle du flint, sans craindre de perdre trop de lumière par réflexion à la surface d'entrée.

Au flint, Thollon substitua le sulfure de carbone et il détermina les angles de telle sorte, que la perte de lumière due aux diverses réflexions est réduite au minimum. La vision directe est rigoureusement obtenue et pour chaque raie amenée au milieu du champ de l'oculaire, les rayons traversent tous les prismes dans la position du minimum de déviation.

La mesure des intervalles se fait à l'aide d'un excellent micromètre, construit par Gautier de Paris. Le pas de vis est de $\frac{1}{5}$ de millimètre et le tambour est divisé en 100 parties, de sorte que chaque division représente $\frac{1}{500}$ de millimètre, soit un peu plus d'une seconde dans le champ de la lunette. Les mesures effectuées par Thollon avec ce micromètre étaient d'une merveilleuse précision. Pour les quatie intervalles dont il a donné les pointés successifs dans le mémoire qui accompagne son atlas, l'erreur moyenne pour chacun d'eux, est à peine d'une seconde.

La dispersion obtenue avec ce spectroscope est énorme. L'écart entre les deux

raies du sodium est de 714,38 divisions, soit de 700 secondes. Mais la grandeur du pouvoir dispersif n'est pas la seule qualité requise pour qu'un spectroscope soit un bon analysateur de la lumière : il est indispensable qu'elle soit accompagnée d'un pouvoir de résolution correspondant (1). Dans l'appareil de Thollon ce pouvoir est extraordinaire.

La séparation en raies simples d'un groupe spectral présente les mêmes difficultés que l'observation des étoiles multiples. A cause des phénomènes de diffraction, il faut pour distinguer deux raies très voisines, que leur écart angulaire soit plus grand, que le pouvoir séparateur du système optique. Si l'emploi de plusieurs prismes augmente proportionnellement la dispersion, dit M. Mascart (2), l'imperfection des surfaces et le défaut d'homogénéité des milieux, même avec des liquides, croissent dans le même rapport; de sorte que le bénéfice des nouvelles réfractions ne tarde pas à disparaître. Dans tous les procédés d'observation directe il existe par conséquent une limite au dédoublement des raies très rapprochées et l'éminent physicien français estime, qu'il paraîtra sans doute difficile de séparer deux radiations, dont les longueurs d'onde ne varient pas plus de I O0000 Or Thollon a dépassé cette limite. Dans son spectre j'ai compté 17 doublets dont l'écart des composantes est en dessous de omm.3 (3). Le milieu du doublet a été pointé, l'extrême rapprochement des composantes rendant le pointage séparé trop incertain. Mais pl. XV, dessin nº 29, les deux raies 272.85 et 273.08 pointées séparément ne diffèrent que de omm.23. Je n'ai pu retrouver ces deux lignes dans les tables de Rowland, mais on peut obtenir aisément une limite supérieure de la variation entre les deux radiations. Sur la même bande les deux raies 83.88 et 84.38, sont distantes de omm.50. Les longueurs d'onde, d'après Rowland, sont respectivement 5325 569 et 5325 460. La différence est 0.109, correspondant à une variation de longueur d'onde de 1/48857.03. En admettant, vu le voisinage des raies, que l'écart soit, comme dans un spectre normal, proportionnel à la différence des radiations, la valeur de la variation pour les deux raies ındiquées serait de 1 106213. En réalité elle est inférieure. Semblable résolution n'est encore aujourd'hui obtenue qu'avec les grands réseaux de Rowland (4).

⁽¹⁾ Thollon a démontré que le pouvoir dispersif et le pouvoir de résolution, peuvent être exprimés par des fonctions symétriques variant en sens inverse entre les mêmes limites et passant par un minimum identique. L'on peut avec un bon prisme de flint, séparer les deux raies du sodium, ou les confondre en une bande qui s'élargira, si l'on augmente la dispersion en faisant varier l'angle d'incidence (Comptes rendus 1881, t. XIII, p. 128).

⁽²⁾ Traité d'optique, t. III, p 564 et 565.

⁽³⁾ Dans le dessin de Thollon l'écart entre les deux lignes du sodium est représenté par 30mm.

⁽⁴⁾ M Michelson, à l'aide de ses ingénieuses méthodes basées sur la visibilité des franges d'interférence, a reconnu que les raies Hαet Hβ de l'hydrogène, qui correspondent aux raies C et F du spectre solaire, sont doubles. Bien que l'écart entre les composantes ne soit que le ¹/₅₀ de celui qui sépare les deux raies du sodium, aucun spectroscope, ni à prismes ni à réseaux, n'a pu encore opérer le dédoublement. M. Mascart le juge presqu'impossible à cause de la largeur des raies élémentaires, comparée à la distance qui les sépare (opera cit., p. 582).

Le dessin du spectre de Thollon a été trop souvent décrit pour qu'il soit nécesssaire d'en faire encore un examen détaillé. Je rappellerai seulement, qu'il va du groupe A (rouge), au groupe b (vert), couvrant une longueur de 10 $^{\rm m}$.23, comprenant 3202 raies spectrales. Dans ce nombre, 2090 sont d'origine purement solaire, 866 d'origine purement tellurique, et 246 ont été appelées mixtes par Thollon. Il les considérait comme le résultat de la superposition d'une raie solaire et d'une raie tellurique.

Le dessin est divisé en quatre bandes longitudinales et il est en réalité la représentation de quatre spectres distincts. La première bande, est le spectre du soleil quand l'astre est à 80° au dessus de l'horizon et que l'air contient peu de vapeur d'eau. La deuxième bande se rapporte au soleil observé à 60° du zénith, l'air étant presque complètement saturé d'humidité. La tioisième correspond à la même distance zénithale de 60°, mais pour un état de l'air voisin de la siccité. La quatrième donne le spectre solaire tel qu'on l'observerait en dehors de l'atmosphère terrestre.

Vu le temps dont je disposais, je ne pouvais songer à poursuivre dans la même voie. Pour continuer l'œuvre en conservant cette division, des années eussent été nécessaires. Je me suis borné à reproduire le spectre tel qu'il s'offrait à mes yeux, sans tenir compte ni de la hauteur du soleil ni de l'état hydrométrique de l'air. D'ailleurs on sait que les raies telluriques sont surtout abondantes dans les couleurs les moins réfrangibles. Les cartes XVI et XVII de Thollon n'indiquent la présence d'aucune et le spectre publié par M. Ludwig Becker en 1890, n'en contient que 116, pour la région comprise entre b et F (1).

Voici la marche que j'ai suivie pour mesurer les distances entre les raies et pour déterminer à l'aide de ces mesures leurs positions sur les planches.

Ainsi que l'avait fait Thollon, j'ai procédé par petites sections dont les raies extrêmes correspondent aux raies appelées par Thollon fondamentales. Elles sont indiquées sur le dessin par un petit signe placé à leur sommet. Leur écart a été mesuré d'abord. Je pointais la première ligne une fois, la deuxième deux fois, puis je revenais à la première. Cette opération a été répétée au moins quatie fois pour chaque section. Les intervalles entre les lignes intermédiaires ont été mesurés ensuite. De b_4 à F, presque toutes les lignes de chaque groupe ont pu être pointées. Au delà de F, un certain nombre ont dû être interpolées. Dans le bleu, les lignes de faible intensité ne se montraient pas avec une netteté suffisante pour permettre d'effectuer un pointage sûr. L'erreur à laquelle je m'exposais, en voulant obtenir une mesure directe, me parut supérieure à celle que je commettais en fixant la position de ces lignes par estimation. Plus tard, j'ai d'ailleurs pu apporter à ces positions toutes les corrections désirables.

⁽¹⁾ En comparant mes intensités à celles de Rowland, j'ai constaté d'assez nombreuses différences De plus entre b et F, mon dessin contient plusieurs lignes que je n'ai pas retrouvées dans les tableaux publiés par le savant américain. Quelques-unes de ces différences pourraient s'expliquer par l'action de l'air atmosphérique.

Dans la mesure des fondamentales, Thollon amenait la première de chaque intervalle au milieu du champ, c'est-à-dire au minimum de déviation. La plus réfrangible en était donc d'autant plus éloignée que l'intervalle était plus grand et sa vraie distance d'autant plus exagérée. Lorsque l'intervalle était deux ou trois fois plus grand que $D_1 - D_2$, il y avait dans ce fait, au point de vue de l'homogénéité du dessin, une légère cause d'erreur. Aussi pour en faire disparaître la conséquence, Thollon se servait-il de tables spéciales, qu'il avait calculées et vérifiées par des expériences directes. J'ai cru pouvoir éviter ce surcroît de réduction, en amenant chaque fois le milieu du groupe au milieu du champ : les raies extrêmes étaient ainsi également éloignées du minimum de déviation. La vérification à laquelle toutes les positions des lignes ont été soumises, a montré qu'en procédant de cette manière, l'homogénéité requise est obtenue à un degré certainement suffisant.

Si le sulfure de carbone jouit de la propriété d'être très dispersif, il a d'autre part le grand inconvénient d'être très sensible aux variations de température. Sous leur influence, la valeur de ses indices de réfraction subit de tels changements, qu'il est impossible de ne pas en tenir compte. Malgré les multiples et minutieuses précautions qu'il avait prises (1), Thollon savait qu'il lui serait impossible d'exécuter toutes ses observations à une température constante, et il dut chercher le moyen d'éliminer de la mesure des intervalles les effets de ces changements.

A la suite de plusieurs séries de comparaisons, il reconnut que les variations qui affectaient les distances entre les raies, étaient proportionnelles au moins dans des limites assez étendues. Dès lors, il suffisait de prendre une de ces distances comme base et d'y rapporter toutes les autres. Thollon choisit celle qui sépare D_1 , et D_2 et lui attribua la valeur de $30^{\rm mm}$. Mesurée chaque fois que dix intervalles successifs avaient été déterminés, son trentième représentait l'unité adoptée, et il ne restait plus qu'à effectuer un calcul de réduction très simple pour obtenir en millimètres la valeur de ces dix intervalles. J'ai suivi une marche semblable. Mais comme j'avais à explorer des régions déjà éloignées du jaune, j'ai cru bien faire de prendre une base plus rapprochée et se trouvant toutefois encore dans le spectre de Thollon. Je choisis l'intervalle des deux raies qui accompagnent b_2 : elles sont très nettes, d'une intensité à peu près égale et d'un pointage facile. Dans l'atlas de Thollon leur distance est représentée par 19.08 unités; c'est à cette valeur que toutes les mesures ont été rapportées (2).

⁽¹⁾ Le spectroscope était toujours recouvert d'une caisse en cuivre creuse et remplie d'eau qu'on pouvait changer à volonté. La chambre où il était installé pouvait être transformée en chambre noire parfaite. Les murs en maçonnerie avaient un recouvrement intérieur en bois de sapin; les portes étaient doubles et les fenêtres munies de volets des deux côtés. Ces précautions maintenaient assez bien la température égale pendant l'espace d'une séance, mais d'un jour à l'autre elle variait notablement.

⁽²⁾ La moyenne de plusieurs centaines de mesures de cette base a donné 370 divisions du micromètre. Le nombre le plus élevé a été 386 Dans les mois de juin et de juillet, alors que la température de la chambre noire était de 25 à 26 degrés, les différentes valeurs obtenues pendant le cours d'une journée, se tenaient entre 345 et 350 divisions. Ces chiffres montrent l'absolue nécessité de tenir compte des changements de densité auxquels est sujet le sulfure de carbone.

Les positions occupées par les différentes lignes peuvent donc être considérées, comme étant celles que donnerait un spectroscope prismatique conservant une même température, cette température étant d'ailleurs celle que Thollon avait supposée invariable pendant le cours de toutes ses observations. Les deux parties du spectre sont ainsi dessinées à la même échelle et la seconde peut réellement être appelée la suite de la première.

Toutes les intensités ont été évaluées par deux observateurs. Quand il y avait désaccord entre mon estimation et celle de l'assistant que M. Perrotin avait bien voulu me prêter, l'opération était recommencée. La différence persistant encore nous nous arrêtions à une moyenne. Je ne saurais assez louer l'utile et dévoué concours que cet assistant, M. Michel Giacobini, m'a constamment prêté. Bien qu'occupé encore par d'autres travaux, son zèle n'a jamais failli; sa coopération m'a été des plus précieuses et une fois encore, je le prie d'accepter mes plus sincères remerciements.

Toutes les réductions terminées, comme je me trouvais de nouveau dans le cas de devoir confectionner les planches loin de l'original, je cherchai un moyen rapide et sûr de pouvoir vérifier l'exactitude de la position des raies. Cette exactitude est en effet une qualité essentielle et un spectre ne présentera de véritable utilité scientifique, que pour autant qu'on pourra déterminer sûrement les longueurs d'onde de ses raies, par rapport à quelques-unes d'entre elles connues et regardées comme fondamentales. Quel que soit le spectroscope employé, il existe assurément une relation entre son mode de dispersion et les longueurs d'onde. Mais en dehors des spectres de diffraction donnés par les réseaux et où l'écart entre les raies est invariablement proportionnel à la différence des longueurs d'onde, dans tous les autres cette relation est une fonction complexe de la nature des prismes, de leurs angles et souvent, ainsi qu'on vient de le voir, de la température. Ayant consulté sur ce sujet M. Trépied, le savant Directeur me déconseilla de rechercher cette relation qui aurait dû être théoriquement exacte et il voulut bien me proposer un mode de discussion basé sur l'interpolation.

Si l'on désigne, me dit-il, par λ_0 et δ_0 , la longueur d'onde et la position d'une raie déterminée de l'une des planches du dessin, pour laquelle on choisira de préférence une raie voisine du milieu de la planche; par λ et δ , la longueur d'onde et la position d'une autre raie quelconque de la même planche, on pourra chercher à représenter la différence λ — λ_0 , par une fonction de la forme :

$$\lambda - \lambda_0 = A (\delta - \delta_0) + B (\delta - \delta_0)^2 + \dots$$

A, B,.... étant des coefficients à déterminer. Chacune des raies fournira une équation de cette forme et l'examen des résidus obtenus après la substitution des valeurs des inconnues dans toutes les équations, c'est-à-dire, l'examen des différences

$$(\lambda - \lambda_0)$$
 obs $-(\lambda - \lambda_0)$ cal...

permettra d'apprécier l'exactitude des mesures d'où l'on a déduit les positions relatives des raies spectrales.

Ce procédé de contrôle constitue en effet un excellent moyen de vérification. Je l'ai appliqué d'abord aux raies fondamentales en déterminant les longueurs d'onde à l'aide de l'atlas photographique de Rowland. Je me suis décidé ensuite, malgré la longueur des calculs, à l'étendre à toutes les raies du dessin, en me servant cette fois des tableaux des longueurs d'onde publiés par le savant américain dans l'Astrophysical Journal de Chicago, année 1895.

A propos de cet énorme travail je ferai les remarques suivantes :

On peut arrêter le développement de l'équation générale au second terme, vu la très petite valeur du coëfficient B.

Cette même équation mise sous la forme,

$$\lambda - \lambda_0 = (\delta - \delta_0)K$$

où K n'est plus une constante, mais la quantité variable

$$K = A + B (\delta - \delta)_0$$

fait voir que K est toujours négatif puisque les termes $(\lambda - \lambda_0)$ et $(\delta - \delta_0)$ sont de signes contraires. Il s'ensuit que A doit toujours être négatif et B positif. En effet, pour une même valeur de $\lambda - \lambda_0$, la quantité $\delta - \delta_0$ augmente avec la réfrangibilité. Donc, la valeur absolue de K doit diminuer à mesure qu'on avance dans le spectre, donc B doit être positif.

Plus δ se rapproche de δ_0 , plus la valeur de K tend à devenir égale à A, c'està-dire, que $\frac{1}{A}$ représente la grandeur de la dispersion élémentaire pour le milieu de chaque bande.

J'ai traité les 7 premières bandes par la méthode des moindres carrés. La comparaison des valeurs trouvées pour les coefficients A, B, avec celles obtenues par la méthode de Cauchy, m'ayant démontré que cette dernière, beaucoup plus brève, était tout à fait suffisante, je l'ai exclusivement employée dans la suite.

Toutes les raies de chaque bande n'ont pas concouru à la détermination des coefficients; celles-là seules dont l'identification pouvait être absolument certaine, ont été prises.

Un assez grand nombre de lignes vues simples avec le spectroscope de Thollon, se trouvaient résolues en deux, voire même en trois, dans les tables de Rowland. Quand ce cas se présentait, j'attribuais à la ligne de mon dessin une longueur d'onde moyenne, en admettant que le milieu du doublet ou du groupe avait été pointé. Ces longueurs d'onde sont suivies dans mes tables de la parenthèse (2R) ou (3R).

Par contre quelques lignes doubles dans mon dessin sont simples dans le

spectre de Rowland. Leur longueur d'onde est alors accompagnée de (1R). L'on pourra constater que le pointé des lignes doubles est en général plus incertain que celui des lignes simples.

Quant aux raies qui avaient été simplement interpolées, j'ai rectifié leur position en procédant de la façon suivante. La position et l'intensité de chacune d'elles, permettaient presque toujours de reconnaître à laquelle des tables de Rowland elles se rapportaient; comme d'ailleurs la valeur de la dispersion élémentaire des fondamentales voisines était connue, j'ai admis, que dans chacun de ces petits intervalles, la dispersion était proportionnelle à la variation de la longueur d'onde. C'est ce qui explique l'uniformité des différences $\Delta_0 - \Delta c$, trouvées pour les lignes de faible intensité, principalement dans les dernières planches.

Enfin, un certain nombre de lignes n'ont pu être identifiées; elles figurent dans les tables sans indication de longueur d'onde

Pour que l'on puisse juger du degré de précision obtenu j'ai déterminé pour chaque bande l'erreur probable de la différence $\lambda - \lambda_0$; en supposant à cette fin 1°, que les valeurs obtenues pour les coefficients A et B étaient rigoureusement exactes,

2°, que la relation

$$\lambda - \lambda_0 = A(\delta - \delta_0) + B(\delta - \delta_0)^2,$$

devrait être rigoureusement vérifiée par les valeurs observées de δ — δ_0 et par le système de valeurs adoptées pour les différences λ — λ_0 .

Le résultat de ce calcul est consigné dans le tableau suivant où la première colonne indique le numéro de la bande, la deuxième le nombre des raies, la troisième la somme des carrés des résidus, la quatrième l'erreur probable déterminée par la formule

$$\xi_p = \xi_m \times 0.7 = \pm \sqrt{\frac{\Sigma r^2}{n-1}} \times 0.7$$

N. 1.	Σr^2	ϵ_r
102	0.101362	± 0.01925
92	0 069680	0.02205
89	0 069371	0.01956
86	0.072800	0 02037
67	0 032529	0.01540
58	0.041806	0.01883
47	0.025073	0.01617
52	0.015551	0.01211
48	0.021780	0.01491
5 ₇	0.041494	0.01883
	92 89 86 67 58 47 52 48	0.101362 92 0.69680 89 0.069371 86 0.072800 67 0.032529 58 0.041806 47 0.025073 52 0.015551 48 0.021780

N_{oa}	N.1.	$\sum r^{-2}$	ϵ_r
11	53	0.048660	0.02121
12	58	0.069361	0.03107
13	40	0.030323	0.01925
14	4 6	0.036920	0.01981
15	34	0.025745	0 01925
16	45	0.024336	0 01630
17	47	o.o10945	0.01071
18	55	0.014397	0 01034
19	48	0.098394	0.03164
20	49	0.012351	0.01113
21	39	0.027104	0.01841
22	47	0.008642	0 00952
23	43	o oo4558	0.00721
24	40	0.005199	0 00798
25	55	o 004951	0.00021
26	47	0.005474	0.00756
27	43	0.004070	0.00679
28	35	0 001668	0.00483
29	46	0.001547	0.00406
30	38	0.001059	0.00371
3 r	3 ₇	0.002077	0.00525
32	38	0.009647	0 01113
33	44	0.001058	0.00343
34	29	0.001097	0.00431
-	1754	0.941029	

En faisant la somme générale des carrés des résidus et celle de toutes les raies, on trouve pour l'erreur moyenne de l'ensemble du dessin,

$$\epsilon'_{m} = \pm 0.023$$

et pour l'erreur probable,

$$\epsilon'_{p} = \pm 0,016.$$

L'on peut également juger, du moins jusqu'à un certain point, si la série successive des bandes forme un ensemble homogène. La dernière raie fondamentale d'un dessin est la première du dessin suivant Par conséquent, en comparant les deux longueurs d'onde λ et λ' de cette raie, calculées à l'aide des coefficients A et B, propres à chacun de ces deux dessins et des valeurs λ_0 et λ'_0 prises respectivement pour origine, l'on doit, si les dessins forment une suite continue, trouver

des valeurs identiques pour λ et λ' . Le tableau suivant montre le résultat de cette comparaison.

Nºs des dessins.	$\lambda - \lambda'$	Nos des dessins.	$\lambda - \lambda$
I-2	- o o35	18-19	 0.060
2-3	+ 0.027	19-20	+ 0.064
3 - 4	 0.00 5	20-21	+ 0.033
4-5	+ 0 060	21-22	- 0 007
5- 6	— 0 020	22-23	— o.o35
6-7	+ 0.044	23-24	+ 0.022
7 - 8	— o o56	24-25	- o.oo2
8-9	+ 0.013	25-26	+ 0.011
9-10	+ 0.028	26-27	 0.018
10-11	- 0.009	27-28	+ 0.001
11-12	+ 0 049	28-29	 0.003
12-13	— 0.035	29-30	- 0.019
13-14	- 0.008	30-3 ı	+ 0.001
14-15	— o oo6	31-32	— 0.00 3
15-16	+ 0.069	32-33	+ 0.008
16-17	— o oo5	33-34	+ 0.003
17-18	+ 0 043		

Les différences ne sont pas très fortes et la distribution des signes est assez satisfaisante. L'échelle n'est donc pas rigoureusement la même d'un bout à l'autre du dessin, mais l'effet de ses variations ne saurait être considérable.

Bien que les travaux parus sur le Spectre solaire soient déjà considé rables, il s'en faut que ce sujet, le plus important d'ailleurs de l'astrophysique, soit épuisé. Nous voyons, au contraire, que chaque progrès réalisé dans les procédés d'observation, permet d'approfondir de plus en plus l'étude analytique des radiations lumineuses et conduit à la découverte de faits nouveaux, du plus haut intérêt en eux-mêmes et du plus grand secours, pour la solution toujours reculée du problème de la constitution des corps. C'est que la lumière qui émane d'une source quelconque ne révèle pas seulement son existence, mais elle renferme en outre le secret de sa composition et de son état physique. Toutes les modifications dont un foyer lumineux est le siège, soit en son propre sein, soit dans l'atmosphère qui l'enveloppe, se traduisent par des changements dans l'aspect, dans la position, voire

même dans le nombre des raies spectrales (1), c'est-à-dire, en un mot, que les phases successives que traverse un astre dans le cours de son évolution, pourraient être décrites, à l'aide des variations observées dans son spectre et que la carte spectrale d'un corps céleste, rigoureusement exacte, est en somme la représentation la plus sûre et la plus fidèle de son état chimique et physique, à une époque déterminée de son histoire.

Assurément, mon dessin de la Région b.-f. du Spectre solaire n'est pas parfait. Malgré les peines que je me suis données, il n'atteint pas la perfection, si justement admirée, du NOUVEAU DESSIN DU SPECTRE SOLAIRE, exécuté par Thollon; mais, tel qu'il est, qu'il me soit permis de croire qu'il possède dans une mesure suffisante les qualités requises pour venir à la suite de l'œuvre remarquable du savant et habile spectroscopiste français, et qu'il pourra comme elle, « servir de repère précieux pour les études ultérieures de la physique solaire ».

⁽¹⁾ Thollon dit avoir vu entre D_1 et D_2 , 4 à 5 lignes très faibles dont la présence n'était pas constante. J'ai à mon tour fait une constatation analogue pour quelques lignes entre b_4 et F. Ces lignes ne figurent pas sur mes planches. M. Georges Higgs de Liverpool, en travaillant avec un réseau concave de quatre pouces de diamètre et d'un rayon de courbure de dix pieds, a obtenu des photographies du groupe D où l'on compte de 25 à 30 lignes. Le dessin de Thollon n'en porte que quinze.

ERRATA (Tables).

```
Dessin nº 2, après 91.52, 4 limites au lieu de 3;
              après 103.42, 6 limites au lieu de 4;
au lieu de 274.85 inté 1, lisez 274.85 inté 1.5;
au lieu de 276.32 inté 1, lisez 276.32 inte 1.5;
Dessin n° 3, après 197.38 double 3, lisez :
                          Groupe de lignes très faibles
                   205.58
                                       0.4
Dessin nº 4, au lieu de 5.90, lisez 5.60;
              raie 209.33, au lieu de - 0.016, lisez + 0.016;
Dessin nº 5, au lieu de 336.35, lisez 335.34;
Dessin nº 6, au lieu de 173.36, lisez 176.36;
              au lieu de 294.13, lisez 296.13;
Dessin nº 8, au lieu de 310.33, lisez 310.38;
Dessin no 10, raie 142.79, au lieu de - 0.012, lisez + 0.012;
Dessin no 13, raie 10.33, au lieu de — 0.009, lisez — 0.007;
Dessin nº 16, au heu de 193.76, lisez 195.76;
Dessin no 19, avant et après 13.81, lisez limite;
               avant et après 21.00, lisez limite;
               au lieu de 316 79 inte 7, lisez 316.79 inte 0.5.
```

PLANCHE I. — DESSIN Nº 1

Log. A = 1.0360026		Log. B = $\bar{6}.8141297$		
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
0 00	7	5166 454	+ 18.044	— 0.020
8.00	7 5	5165.588	17 178	0.000
11.14	r	5165.209	16.779	0.044
11.99	I	5165.080	16 670	- o.o69
15.62	4.5	5164.724	16.314	- 0.023
18.24	0.3	5164 404	15 991	— о о5 г
20 58	o.3	5164.172	15 762	— 0 024
21.94	o.3	5164 0 07	15.597	— o o39
24 15	o . 3	5163.756	15.346	- 0.046
25.94	o.3	5163.585	15.175	- 0.019
28.96	0.5	5163.327	14.917	+ 0.054
30.45	0.5	5163 074	14 664	— o o32
32.35	0.3	5162.902	14 492	+ 0 005
33.84	0.3	5162 690	14.280	- 0.042
36.34	8	5162 449	14 039	 0.008
41.16	I	5161.910	13.500	<u> </u>
41.76	1	5161 849	13.439	— 0.009
45.93	I	5161.353	12.943	— o.o6 ₇
47.43	1	5161.194	1 2 784	— o.o36
49.33	0.5	5161.006	12.596	- 0.014
54.11	I	5160.554	12.144	+ 0.057
55.42	I	5160.419	12.009	+ 0.064
61.21	I	5159.776	11.366	+ 0.055
62.27	ĭ	5159.634	11.224	+ 0 019
6 5.66	6	5159.231	10.821	- 0.017
6 9.46	0.8	5158.832	10.422	+ 0.022
70.55	0.8	5158 701	10.291	+ 0010
75.64	I	5158.152	9.742	+ 0.021
77.46	1	5157.915	9.505	— o o 16
78.68	0.8	5157.783	9.373	- 0.014
82.26	o. 6	5157.376	8.966	 0.028
84.21	0.6	5157.163	8 753	- 0 027
87.61	1.5	5156.823	8.413	+ 0.005
88.47	1.5	5156 728	8 3 1 8	+ 0.004
90.35	limite	5156.530	8.120	+ 0.013
93.13	0.5	5156.239	7.829	+ 0.027
95.91	5	5:55 935	7.525	+ 0.027
98.39	limite	5155.694	7.284	+ 0 058
101.75	4.5	5:55.303	6.893	 0.035
108.29 d	ouble o.8	5154.542 (2R) 6.132	- o oi i

Positions.	Intensités.	λ_{R}	(λ - λο) r	Δ_{o} - Δ_{c}
111.31	- 5	5154.244	+5.834	+ 0 022
116.21	r.5	5153.687	5.277	000
117.21	1.5	5 t 53.584	5.174	+ 0.006
118.94	4	5153.414	5.004	+ 0 025
128 57	4	5 t 52.36 t	3.9 5 t	+ 0.024
130.99	6	5152.087	3.677	+ 0.014
140.58	6,	5151.020	2.610	— o.oo8
143.25	limite	5150.736	2.326	- 0.001
145 00	1	5150.525	2.115	- 0.02 I
146 76	1.5	5150.363	1.953	+ 0.008
150.38	limite	5149 964	1.554	+ 0.003
155.74	1.5	5149.392	0 982	+ 0.016
156.74	1.5	5149.267	0.857	- 0.001
159.10	o . 5	5149.013	0.603	- 0.001
160.94	0.5	5148.851	0.441	— o o39
162.35	0.3	5148.627	0.217	+ 0.032
164 64	6	5148.410		
165.92	5.5	5148.222	<u> </u>	— 0.049
168.90	I	5147.871	o 539	+ 0.043
171.52	3.5	5147.652	o 758	- 0 011
174.96	0.5	5147.273	1.137	- 0.016
178.40	o. 5	5146.945	1.465	+ 0.028
180.53	6	5146.659	1.751	- 0.024
182.73	limite	51 4 6.486	1.924	+ 0.039
184.48	2	5146.291	2.119	+ 0.033
190.81	3	5145.636	2 774	+ 0.064
192.50	lımite	5145.403	3.007	+ 0.015
193.56	5.5	5145 . 271	3.139	- 0.002
197.63	1.5	5144.847	3.563	+ 0.014
198.33	limite	5144.758	3.652	+ 0 002
206 07	2	5 143.90 1	4.509	0.019
207.50	0.5	5143.764	4.646	- 0.002
209.69	limite	5143.511	4 899	<u> </u>
213 32	6.5	5143.111	5.299	- 0.026
214.70	6	5142 958	5.452	<u> </u>
217.47	6.5	5142.693	5.717	+ 0.004
224.67	7	5141.918	6.492	+ 0.006
228.34	1	5141.497	6 913	— o.o18
229 34	1	5141.386	7.024	- 0.022
232 72	I	5140.992	7.418	— 0.05 I
237 72	limite	5140.553	7 857	+ 0.048
239.02	limite	5140.336	8.074	- 0.029
243.62	limite	5139.817	8.593	- o.o53
245.69	8	5139.644	8 766	— o.oo3
247.56	8	5139.427	8.983	- 0.019
252.26	limite	5138.890	9 520	- 0.051
255.18 d		5138.604 (2R)	9 806	- 0.023
257 71 d	ouble limite	5138 27 9	10.131	— o o76

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	()))	A A
			$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δ ₀ - Δ _c
	ouble limite	5137.808 (2R)	10.602	+ 0.017
264.77	7	5137 558	10.852	 0.038
268 07	7	5137.250	11.160	— o oo5
270 34	I	5136 969	11.441	 0.030
271.52	0.5	5136.835	11.575	 0 027
273 91	0.5	5136.625	11 785	+ 0.010
275.21	o 5	5136.443	11.967	— 0.034
276.67	o . 8			•
277.41	2	5136.270	12.140	- 0.006
280.50	I	5135.880	12.530	— o o32
281.81	I	5135.752	12.658	- 0.010
285.64	0.5	5135.355	13 o55	- 0,005
286.52	0.5	5135.273	13.137	- 0.007
290.74	2	5134.849	13.561	+ 0.035
292 40	2	5134.697	13.713	+ 0 061
294.05	0.4	5134 505	13.905	+ 0 045
299.71	8	5133.870	14.540	+ 0.016
	limite	•		
309.23	2 5	5132.843	15.567	+ 0 006
-	limite	•	,	, 0000
317.49	4	5131.942	16.448	— 0 032
320.23	7	5131.642	16.768	- 0.028
	limite	•		0.020
	double limite			
	limite			
328.42	1.5	5130.757		

PLANCHE I. — DESSIN Nº 2.

Log. A = 1 o214061			Log. B = $\overline{5}.1487168$	
Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_0 - \Delta_2$
0.23	7 lımıte limite limite	5131.642	- + 18.344	— o o63
8.42	1.5	5130.757	17.459	— o o5o
10.41	3 limite	5130.543	17.245	- 0.035
17.27	4	5129.805	16.507	— o o32

ericustation distribution dispussions

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ - λο) R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
19.68	5	5129 546	+ 16.248	- 0.028
21.63	6	5129.336	16.038	- o.o25
24.19	0 2	5129.080	15.782	— 0.001
28.08	0.4	5128.560	15.362	+ 0 003
32.08	I	5128 250	14 952	+ 0.031
35.86	I	5127 858	14.560	+ 0 050
38 43	. 7.	5127 533	14 235	+ 0.004
	limite			
	limite			
	limite	56-2	-2 0-2	+ 0.030
49 ² 7	6	5126.371	13.073	T 0.030
	limite limite			
	limite			
58.13	6	5125.423	12.125	+ 0.032
59.28		5125.300	12.002	+ 0.033
63.73	7 1.5	5124.785	11.487	- 0.011
67.36	lımite	5124.364	11.066	- 0.029
68.79	1.5	5124.219	10 921	— 0,020
72.38	7.5	5123.899	10 601	+ 0.048
76 12	1	5123.458	10.160	+ 0.010
77.15	3	5123 390	10.092	+ 0.053
81.10	I	5122.968	9 670	+ 0 056
83.63	2	5122.613	9.315	— 0.027
85.08	limite	5122 481	9.182	— o oo3
86.57	1.5	5122.299	9.001	- o.o25
91.52	7	5121.778 (2R)	8.480	 0.030
,	lımite	,, .		
	limite			
	limite			
100.80	1	5120.802	7 504	+ 0.004
102.82	3	51 20 5 92	7.294	+ 0010
103.42	I	5120.5 16	7.218	- 0.001
	limite			
	lımite			
	limite			
	limite	_	_	
114 92	2	5119.292	5.994	+ 0 033
118 01	0.5	5118 987	5 689	+ 0.027
124.55	0.3	5118.241	4.943	- 0 022
126 03	3	5118.112	4.814	+ 0.006
127.41	0.8	5117 933	4 635	0.026
133 24	0.8	5117 334	4 o35	- 0.006
135.28	0.5 limite	5117.071	3.873	— o.o53
142 73	limite	5116.359	3.061	+ 0 025 - 0.030
143.55	limite 3.5	5116 217 5115 961	2 919 2.663	+ 0,008
146.33 150.06	5.5 6	5115.566	2.268	+ 0.007
130.00	J	31131300	2.200	1 0.007

Positions.	Intensités.	Ϋ́R	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
158.87	1.5	5114.683	_L 1 385	+ 0.054
161.29	1.5	5114.431	1.133	+ 0.057
168 50	4	5113 617	0 319	+ 0 002
171 52 dou		5113 298		, , ,
177 32 404	limite	5112 663	— o 635	 0.026
179.78	limite	5112 458	0 840	+ 0 027
183.10	I	5112 049	1 249	— o o34
185.00	1	5111 912	1 386	+ 0.026
186 02	r T	5111.802	1.496	+ 0 024
188.39	1	5111.539	1.759	+ 0.009
189.39	I	5111.426	1.872	+ 0.001
192.21	0 5	5111.138	2 160	+ 0.007
194 00	1.5	5110.938	2 360	— o oo6
197.38	8	5110.574	2.724	- 0 017
201 13	limite	5110 188	3.110	- 0.012
204 48	6	5109.827	3 471	- 0.024
208 34	limite	5109.475	3.823	+ 0.026
209 84	I	5109.291	4 007	0.002
212.00	o 8	5109.083	4 215	+ 0.014
214 38	limite	5108.805	4.493	- 0 009
217 02	I	5108 563	4 735	+ 0.016
218 99	limite	5108.359	4 939	+ 0.016
220.59	limite	5108 149	5.149	- 0.028
221.76	0.5	5108.056	5 242	0.000
223.92	6.5	5107.823	5.4 7 5	— 0.009
226.22	6.5	5107.619	5.679	+ 0 025
231 73	limite	5107.047	6.251	+ 0.023
235.3 ₇	I	5106.623	6.675	- 0.025
236.63	I	5106.556	6.742	+ 0.038
244.43	6	5105.718	7.580	+ 0.005
249 03	limite	5105.260	8.038	+ 0.020
250.63	limite	5105.066	8 232	- 0.009
255.09	4.5	5104 614	8 684	- 0.003
257 66	4.5	5104.366	8.932	+ 0.013
259.2I	4 5	5104 204	9.094	+ 0.010
261.88	o 5	5103.909	9 389	- 0.012
265.24	0.5	5103.567	9.731	— 0.009
269.3 ₇	5	5103.142	10.156	+ 0.011
274.85	I	5102.599	10.699	+ 0.006
276.32	I	5102 410	10 888	— o.o33
281.60	limite	5101.994	11.304	+ 0.063
283.64	limite	5101 655	11.643	— 0.042
288.26	0.5	5101.251	12.047	+ 0 025
289.99	1.5	5101 028	12.270	- 0.029
292.66	2	5100.827	12.471	+ 0.048
296.76	lımite	5100.413	12.885	+ 0.051
299.48	6	5100.108	13.190	+ 0.022
306.25	6 5	5099.497	13.801	+ 0.007

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
307.71	6	5099.251	 14 047	o.oog
311.23	7.5	5098.885	14.413	- 0.011
312.52	6	5098 751	14.547	- o.o15
315.45	0.5	5098.492	14.806	+ 0.022
316.84	I	5098.302	14.996	- 0.027
323.44	2	5097.668	15.630	+ 0.004
324.88	0.2	50 97 489	15.809	- 0.028
328.39	7	5097 175	16.123	+ 0.010

PLANCHE II. — DESSIN Nº 3.

Log	$A = \overline{1.01}$	02614 <u>I</u>	$\log B = \bar{6}.8262$	7 ⁵ 7
Positions.	Intensités	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ - λ ₀) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
3.44	2	5097.668	, , , , , ,	
4.88	0.2	5097.489		
8.39	7	5097.175	+ 18.017	+ 0.037
9.06	1	5097.038	17.880	0.030
3	limite	5597.555	27.000	0.030
doubl	e limite			
doubl	e limite			
19.38	0.5	5096.031	16.873	+ 0.042
24.14	ĭ	5095.512	16.354	+ 0.020
25.60	I	5095.348	16.190	+ 0.000
27.35	1 5	5095.117	15.959	- 0.023
,	lımite	g ,	9-9	0.023
32.59	5	5094.594	15.436	— o o13
36.07 double	е і	5094.199	15.041	0.046
40.38	limite	5093.858	14.700	+ 0 062
Gro	upe de lignes	très faibles.	-4.700	1 0 002
48.12 double		5092.977 (1 R)	13.819	- 0.011
51.27	1	5092.665	13.507	+ 0.004
52.79	1	5092.483	13.325	- 0.019
56.94	1	5092.058	12.900	- 0 012
58.5 r	1	5091.896	12.738	- 0.010
62.17	0.5	5091.477	12 319	- 0.032
63 72	0.5	50gr.353	12.195	- 0.013
6 ₇ .56	7	5090.954	11.796	- 0.012
70.56	0.5	pR	7,9	3,012
71.46	limite	5090.569	11.411	+ 0.008

Positions.	Intensités.	λ_{R}	(λ - λ ₀) r	Δ_0 - Δ_c
73.16	0.8 -	5090.391	+11.233	+ 0.006
77.16	limite	5090.004	10.846	+ 0.035
81.06	limite	5089 541	10.383	- 0.024
82.43	o 3	pR	10 303	3.32-7
•	08	5089.38 ₇	10.220	+ 0.016
82.93 85.18		5089.134	10 .22 9 9.976	- 0.002
	4	5088.719	9.561	- 0.003
89 17 93 19 doubl	4 5 et lumi	te 5088.331 (1 R)	9.173	+ 0 025
100.13	5 4.5 et iimi	5087.601	9.173 8.443	+ 0.014
100.15			8.081	- 0.01 4
	limite	5087.239 (1R)		- 0.015 - 0.025
104.56 108 22		5087.104	7.946 - 636	+ 0.042
	1 1.5	5086. 7 94	7.636	+ 0.060
110 56		5086.570	7.412	
111 30	I None in a	5086.422	7 264	- 0.014
115.00	limite	5086 078	6.920	+ 0.027
116 93	limite	5085.856	6.698	+ 0.005
118 98	2.5	5085.668	6.510	+ 0.030
126.15	limite	5084.876	5 718	— 0.023
127.88	I	5084.734	5.576	+ 0.013
132.60	7	5084.279	5.121	+ 0.043
134 74 doubl	e 2	5083 958 (2R)	4.800	— o.o56
140.08	7	5083.518	4.360	+ 0.052
143.19 doubl		5083 138 (2R)	3.980	— o.oo5
146 41	limite	5082.829	3 671	+ 0.015
149 52	6	5082.526	3.368	+ 0.034
151 09	limite	5082.363	3.205	+ 0.032
154.27	0.8	5081.942	2.784	— o.oбī
156.69	o 8	5081.764	2.606	+ 0.008
161.37	7	5081.286	2.128	+ 0.016
162.93	0.2	5081.111	1.953	- 0.004
166.83	7	5080.714	1.556	0.000
168.49	2	508.0505	1.347	 o 040
172.16	5	5080.144	0.986	- 0.024
174.23	7	5079.921	0.963	o.u35
176.29	0.3	5079.732	0.574	— o.or3
179.57	7.5	50 79.4 09	0.251	0.000
182.03	7	5079.158		
188.05 doub	le 1	5078.541 (1R)	<u> — 0.617 </u>	0.000
191.17	0.2	5078.246	0 912	+ 0.024
197.38 doub	le 3	5077.562 (1R)	1.596	 0.025
Gro	oupe de lignes	très faibles.		
Id.	id. id.			
205.58	04	5076.807	2.351	+ 0.058
208 08	I	5076.504	2.654	+ 0 010
208 68	7	50 7 6 450	2.708	+ 0.017
213.27	limite	5075.989	3.169	+ 0 024
218 74 doub	le 2	5075 411 (2R)	3.747	+ 0.004
223.41	7	5074.932	4.226	0.000
·	-	,	,	

Intensités.	Positions.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
227.60	lımite	5074 521	4.63 ₇	+ 0.016
G roupe de li	gnes très faible	es.	, ,	, 0,010
236 55	I	50 7 3.637	5 521	+ 0 042
241.37	3	5073.114	6.044	0 001
243.71	7	5072.849	6.309	- o.o.8
² 47 77	3	5072.479	6 679	+ 0 024
249.87	7	5072 257	6.901	+ 0.015
252. 73	limite	5071.969	7.189	+ 0.018
255.44 doub	le 2.5	5071.666 (1R)	7 49 ²	- 0.011
261 15	limite	5071 098	8.060	0.000
265.8o	limite	5070.615	8.548	- 0.012
267.5 I	limite	5070.471	8 687	+ 0.017
(Groupe de lign	es très faibles.	,	1 0.017
273 76	lımite	5069.802	9.356	- 0.019
275.56	r.5	5069 592	9.566	- 0.047
279 22	1.5	5069.267	9.891	— 0.002
282.32	7	5068 944	10.214	- 0.011
2 86.99 doub		5068.485 (1R)	10 673	+ 0.001
292.59 doub	le 2	5067.914 (2R)	11.244	+ 0 005
295.10	limite	5067.679	11.479	+ 0.013
298.14	6.5	5067.336	11 822	- 0.022
301.50 doub		5066.974 (2R)	12.184	- 0.046
305.73 doub		5066.496 (2R)	12.652	— 0.088
309 95 d oub	le 2	5066.126 (2R)	13 032	— 0.044
312 98	limite	5065.890	13.268	+ 0.026
315.75	lımite	5065.556	13.602	- 0.03o
317.89	5.5	5065.380	13.778	+ 0.010
319.39 .	7	5065.207 (2R)	13.951	- 0.013
323.14	6.5	5064.836	14.322	— 0.006
324.60	li m ite	•	, –	0.000
327.85	o 5			

PLANCHE II. — DESSIN Nº 4.

Log A = 2.9973479			$\underline{\text{Log. B}} = \overline{6.8183}$	538
Positions. 3.14 5.90 8.85	Intensités. 6.5 limite 0.5	λ _R 5064.836 5064.557 5064.244	$(\lambda - \lambda_0)_R$ + 16.223 15 945 15.832	$\Delta_0 - \Delta_c$ - 0.011 - 0.041 + 0.010

Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
12.21	limite	5063.927	+ 15.315	+ 0.004
14.31	limite	5063.699	15.087	- 0.015
16.87	I	5063.479	14.867	+ 0.024
17.37	I	5063.335	14.723	- 0.002
23.30	r.5	pR	. ,	
26.03	o . 8	5062.530	13.918	- 0.003
28.53	0.8	5062.285	13.673	+ 0.011
30.03	limite	5062.066	13.454	- 0.056
32.62	limite	5061.882	13.270	+ 0.021
46.51	limite	50 60 476	11.864	+ 0019
48.33	6	5060.258	11.646	- 0 0 1 6
51.71	0.8	5 059.964	11.352	+ 0.012
55 î8	limite	5059.575	10.963	- 0.007
60.61	limite	5059 409	10.797	- 0.033
61 06	0.8	5058.989	10.377	- 0.007
63.72	2	5058.674	10.062	- 0.047
69.11	2.5	5058.167	9.555	+ 0.012
74.41	3	5057.665	9.053	- 0.029
78.19	0.5	pR	9.022	0.029
80.63	4	5057.021	8.409	100.0 +
84.74	т 2	5056.617	8.005	+ 0.010
85.90	0.4	5056.428	7 816	- 0.063
89.68	4	5056.169	7.557	+ 0.058
93.17	limite	5055.762	7.150	0.000
96.92	limite	pR	7.130	0.000
102.42	6	5054.821	6.209	+ 0.044
104.15	0 2	pR	0.209	1 0.044
106.24	0.2	pR		
110.73	0.5	pR		
113.20	0.5	5053. ₇ 56	5. 144	+ 0.002
116 00	0.8	5053.477	4.865	+ 0.002
119.10	0.7	5053.170	4.558	+ 0.005
120.20	0.7	5053.170 5053.056		+ 0.000
122.34	1	5 052. 803	1 -444 4 191	- 0.03 ₁
125.01	1.5	* pR	4 191	- 0.031
127.81	1.5	5052.338	3 726	
130.48	1	p R	3 720	+ 0.044
132.45		5051 825	3.213	2 225
133.85	7 1	5051.683		— o.oo5
136.21	0.2	5051.488	3.071 2.876	- 0.007
139.53	0.8	5051.488	2.533	+ 0.033
_		•		+ 0.021
142.17 145.02	o 4 o.8	5050.919 5050.626	2.307	+ 0.058
150.68		5050.626	2.014	+ 0.049
150.64	7 6	5050.008	1.396	— 0. 006
164.76	6	5049.035	0.423	+ 0.014
166.71		5048.612		
	1.5	5048.409	·- o 2o3	- 0.009
168.19	т 5	5048.242	0.3 ₇ 0	- 0.029

D : 111	T . •	•		
Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
169 38	1.5	5048.120	- 0.492	— o.o33
172.47	limite	5047 898	0.214	+ 0.052
173.56	limite	5047.726	o.886	— 0 O12
176.00	lımite	5047.483	1.129	— 0.01 3
178.64	limite	5047.301	1.311	+ 0.067
184.66 dou	ble limite	pR		
190.68	I	pR		
197.07	limite	5045.454	3.168	+ 0.050
201.4 6	li m ıte	5044.945	3.667	— 0.028
206.85	7	5044.394	4.218	— o . o46
209.33	I	5044.212	4.400	0.016
213 58	1.5	5043 <i>7</i> 61	4.851	- o.o14
215.20	0.5	5043.475	5.137	- 0.042
218 66	0.8	pR	,	
220 24	o 8	pR		
224.07 doul	ble limite	pR		
227 66	6	5042.367	6.245	- 0.019
232 34	8	5041.936	6.676	+ 0.011
233.73	7	5041.795	6.817	+ 0.007
235.39	3	5041.633	6.979	+ 0.008
236.39	3	5041.499	7.113	- 0.027
239.02	8	5041.255	7.357	- 0.012
240.72	7	5041.069	7.543	- 0.03 ₁
243.85	ī	5040.78 7	7.825	- 0.005
247.19	I	5040 422	8.190	— 0.042
250.29	6.5	5040.138	8.474	— 0.021
252.22	0.5	5039.951	8.661	- 0.019
254.89	0.5	5039.683	8.929	- 0.019 - 0.024
256.60	r	5039.542	9.070	+ 0.001
257.60	7	5039.428	9.184	— 0.001 — 0.012
25 9.46	ó 8	5039 239	9.373	— 0.012 — 0.020
261.46	0.8	5039.065	9.547	+ 0.005
264.25	6	5038.774	9.838	— 0.005 — 0.015
266.41	6	5038.579	10.033	+ 0.002
271.91	0.5	pR	10.055	1 0.002
272.50	2	5037 983	10.629	+ 0.003
273.50	2	5037.885	_	
277.60	3	5037,496	10.727 11.116	0.003
281.72	4	5037.105	11.507	— 0.015 — 0.009
285.19	6	5036.645	11.967	+ 0.028
288 38	4	5036.449	12.163	+ 0.005
291.87	8	5036.122 (2R)		+ 0.023
294.74	0.5	5035.846	12.490	+ 0 038
297.59	8	5035.542	12.766	+ 0.042
301 36	limite	pR	13.070	+ 0.021
305.43 doub		pR		
308.06 doub		5034.442 (2R)	* 4 *	_
315.95 doub			14.170	- 0.062
2.2.95 4041	0.5	5033. ₇₇₄ (2R)	14.838	+ 0.039

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_0 - \Delta_C$
320.67 doul	ble o.3	5033 305 (1R)	<u> </u>	+ 0 029
324.71 dou		5032.912 (1R)	15 700	+ 0.030
333.12 dou		5032.015 (2R)	16.597	+ 0.050
341.51	6.5	5031.199	16.413	— o.o54

PLANCHE III. — DESSIN Nº 5.

Log.	$A = \bar{2}.984$	11178 1	$\log B = \bar{6}.664$	4925
			(2. 2.)	
Positions. In	ntensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
4 71 double	3	5032.912 (1R)		
13.12 double	3	5032.015 (2R)		
21.51	6.5	5 031.19 9	+ 16 076	+ 0.006
24.01	I	5030.960	15.837	+ 0 014
31.85	0.3	5030.218	15.095	+ 0.041
33.18	0.3	5030.096	14.973	- 0.05 ₂
35 68	6	5029.805	14.682	+ 0.001
37.03	limite	5029.660	14.537	— 0.012
44.03	0.2	pR		
47.00	0.2	5028.719	13.596	+ 0 022
51.61	7	5028.308	13.185	+ 0 060
54.63	6	5027.939	12.816	— o.or3
60.08 double	o.5 et 8	5027.356 (2R)	12.233	— o.oo6
	limite			
77.11	6	5025. <i>7</i> 49	10.626	- 0.010
79 84	3	5025 482	10 35g	— 0.00 9
82,05	3	5025.256	10.133	— O O22
84.66	6	5025.027	9 904	- 0.020
86.90	limite	pR		
91.30	I	5024.403	9.280	+ 0 025
99.07 double	I	5023.603 (2R)	8 480	+ 0.019
101.67	4	5023.372	8.249	+ 0.003
104 92	5	5023 052	7.929	- 0.001
111.35	7	5022.414	7.291	- 0.014
114 72	1	5022.108	6.985	+ 0 007
117 12	4	5021.86 9	6.746	0.000
118.12	5	5021.778	6.655	+ 0.014
126.21	I	5020.998	5.875	+ 0 012
134.09	7	5020.208	5.085	- 0.014
137.17	0.5	5019.912	4.789	<u> </u>

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λ ₀) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
142 86	I	5019.364	+ 4 241	— 0.00g
150 55	10	5018.629	3 506	0.009
152.31	3	5018 . 463	3.340	+ 0.004
159.81	7	5017.762	2.639	+ 0.028
166.94	6	5017.060	1.937	+ 0.025
171.03	5	5016 659	1.536	+ 0.009
174.33	7	5016.340	1.217	+ 0.009
186.86	8.5	5015.123	/	1 0.009
194.34	9	5014.413 (2R)	- 0.710	+ 0.011
197.72	I	5014.100	1.023	+ 0 024
199.81	5	5013.871	1.252	- 0.004
204.12	5	5013.479	1 644	+ 0.022
210.44	5	5012.875	2.248	+ 0 023
213.02	6	5012.625	2 498	+ 0.021
216.68	9.5	5012.252	2.871	0.000
228.76	5	5011.119	4.004	+ 0.027
235.79	3	5010.396	4.727	- 0.010
237.85	4	5010 199	4.924	- 0.020
241.87	3 5	5009.829	5.294	- 0.010
244.14	I	5009.604	5 519	- 0 012
252.61	2	5008 825	6.298	+ 0.021
262.03	3	5007.912	7.211	+ 0.009
267.14	9.5	5007 429 (2R)	7.694	+ 0.015
278.91	9.5	5006.306	8.817	+ 0.017
282.92	9	5005.896	9.227	- 0.010
285.72	0.5	5005.581	9.542	- 0.05 ₇
288.37	2	5005.3 ₄₇	9 776	- 0.019
291.50	2	5005.068	10 055	- 0.019
297.32	I	5004 547	10.576	+ 0 016
300 44 303 65	5	5004.226	10.897	— o oo8
303.65 313.62	5	5003 924	11.199	- 0.004
	6	5002 976	12 147	0.000
316 02	2	5002.77 I	12.352	+ 0,021
322 87	8	5002.044	13.079	- 0.044
327.36 double	0.5	5001.654	13.469	- 0.017
332.75	4	5001.165	13 958	+ 0 007
336.34	0.5	5000.917	14 206	+ 0.004
339.37	7	5000.526	14.597	- o.oo3
340.56	0.5	5000.388	14.735	— o o26
348.26	7	4999 689	15.434	+ 0.003

PLANCHE III. — DESSIN Nº 6.

Lo	og. A = $\frac{1}{2.969}$	1615 Lo	$og. B = \bar{6}.9364$	<u>.786</u>
Positions.	Intensités.	λ_{R}	(λ - λ ₀) _R	Δ_0 - Δ_c
2.87	8	5002.044		
7.36 doub		5001.655 (1R)		
12.75	4	5001.165		
15.34	o.5	5000.917		
19.37	7	5000.526		
20.56	0.5	5000.388		
28.26	7	4999.689	+ 13.286	- 0 017
33.03	3	4999.297	12.894	+ 0.007
41.38	6	4998.408	12 005	— o o45
45.09	o 5	4998.139	11.736	+ 0.040
53 84	5	4997.283	10.880	+ 0.017
56.26	6	4997.024	10.621	- 0.012
61.01 dou	ble 1	4996.558 (1R)	10.155	- 0.026
68.64	3	4995.835	9.432	— 0.025
71.34	2.5	4995.586	9.183	- o.o18
84.82	8	4994.316	7.913	- 0 011
89.52 dou	ble 3	4993.895 (2R)	7.492	+ o.o12
93.30 dou		4993.615 (2R)	7 212	- - 0.080
97.84	I	4993.173	7.770	+ 0.048
104.78 trip	le 1	4992.461	6.058	+ 0.009
109.09 dou		4992.036 (1R)	5 633	0.000
115.20	7.5	4991.452	5.04 9	- 0.008
117.58	7.5	4991-247	4 844	+ 0.010
124.33	3	4990.625	4.222	+ 0.022
129.44 dou	ble 0.5	4990.147 (1R)	3.744	+ 0.036
133.63 dou		4989.730 (1R)	3.327	+ 0.001
138.33	3	4989 325	2.922	+ o.o35
140.21	7	4989.130	2.727	+ 0.017
147.52	ó.8	4988.313	1.910	+ 0.022
156.47	limite	4987.610	1.207	+ 0.017
162.19	2	4987.088	0.685	+ 0.029
169.23	5	4986 403		
172 04	3	4986.165	— o.238	+ 0.024
173.18	limite	pR		
173 36	8	4985.730	0.673	- 0.000
179.95	8	4985.432	0.971	+ 0.027
186.88	2	4984.806	1.597	+ 0.045
192 05	8	4984.297	2.106	+ 0.015
194.86	8	4984.028	2.375	+ 0.00
			•	

Positions. 201 23 206.10 209 78 213.56 218.06 221.68 226.01 234.51 240.11 243.59 247.55 251.63 256.36 261.80 doubl 272.06 278.63	Intensités. 8 75 8 1 8 1 1 8 1 0.5 0.5 8 4 limite 5	λ _R 4983.433 4982.994 4982.682 4982.319 4981.550 pR 4980.352 4979.885 4979.485 4979.112 4978.758 (2R) 4978.372 4977.862 (2R) 4776.868 4976.508	(λ-λ ₀) _R 2.970 3.409 3.721 4.084 4.491 4.853 6.051 6.518 6.918 7.291 7.645 8.031 8 541 9.535 9.895 10.089	$ \Delta_0 - \Delta_0 \\ + 0.002 \\ + 0.013 \\ + 0.043 \\ + 0.037 \\ + 0.009 $ $ - 0.007 \\ + 0.041 \\ - 0.038 \\ - 0.049 \\ - 0.028 \\ + 0.019 \\ + 0.006 $ $ - 0.046 \\ - 0.019 \\ - 0.023 $
276.32	5	4976.508	-	— o.o46

PLANCHE IV. — DESSIN Nº 7.

Log. A = $\overline{2.95660}$	81	Log. B = $\overline{6}.485667$	2_
Positions. Intensités. — 7.99 8 + 11.25 7 18.98 3 20.70 6 26.01 7 39.42 4 40.64 double 1 42.87 1 48.24 7 52.38 1 68.19 8 70.78 2 78.34 2	λ _R 4973.281 4971.531 4970.829 4970.671 4970 098 4968.880 4968.769 (1R) 4968.569 4968.080 4967.700 4966.270 4966.036 4965.351	(λ - λ ₀) _R + 15.496 13.746 13.044 12.886 12.313 11.095 10.984 10.784 10.295 9.915 8.485 8.251 7.566	$\Delta_0 - \Delta_0$ + 0.045 + 0.055 + 0.060 + 0.058 - 0.029 - 0.023 - 0.019 - 0.009 - 0.001 - 0.001 - 0.009 - 0.006

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δ_{o} - Δ_{c}
81.03	3	4965.107	+ 7.322	 0.005
80 82 doub	le 1	4964.312 (1R)	6.527	- 0.001
96.31	lımite	4963.725	5.940	+ 0.002
101.62	limite	4963.245	5 460	+ 0.005
107.09	6	4962 751	4.966	+ 0.008
110.23	I	4962.467	4.682	+ 0.009
113.91	3	4962.095	4.310	+ 0.029
123.45	2	4961 235	3.450	 0.023
144 o3 doub	ole 3	4959.350 (2R)	1.565	- 0.042
154.57 doub	ole 1	4958.431 (1R)	0.646	- 0.007
161.78 estpee		4957.785		
165.13 est ^{pée}	10	4957.480	 0.305	- 0.002
171.41	limite	4956.922	0.863	+ 0.008
179.74	limite	4956.152	1.633	- 0.009
192.60	5	4954.986	2.799	— o.o13
194.86	5	4954.782	3.003	<u> </u>
198.44	limite	4954.472	3.313	0.000
201.76	lımite	4954.179	3.606	+ 0.007
207.54	limite	4953.612	4.173	- 0.040
210.27	6	4953.392	4.393	- 0.012
215 58	6	4952.823	4.962	- 0.012
220.57	5	4952.461	5.324	- 0.015
230.09	0.5	4951.606	6.179	— 0.012
238 95	0.4	4950.801	6.984	<u> </u>
244.73	7	4950.291	7.494	— 0.009
250.73	limite	4949.753	8.032	— o.oo7
264.49 dou	ble 0.5	4948.520 (1R)	9.265	- 0.003
272.79	2	4947·77 ⁸	10.007	+ 0.001
286.34	8	4946 568	11.217	+ 0.006
290 31	3	4946.215	11.570	+ 0.010
294.81	5	4945.814	11.971	+ 0.013
296.97	4	4945.622	12.163	+ 0.015
306 <i>77</i>	limite	4944•7 ⁵ 1	13.034	+ 0.024
309.97	ĭ	4944.467	13.318	+ 0 025
330.35	8	4942.660	15.125	+ 0.041

PLANCHE IV. - DESSIN Nº 8.

Log. A = 2.9485131	Log. B = $\overline{6}.666414$
--------------------	--------------------------------

Positions.	Intensités.	λ_{R}	(λ-λ ₀) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
10.35 double	8 et o 3	4942.660 (1R)	+ 14.610	
16. ₇ 8	0.2	4942.083	14.033	— o.or5
23.32	limite	4941.496	13.446	0.011
32.53	limite	4940.669	12.619	0 008
38.30 double		4940.152 (1R)	12.019	- 0.004
41 47	8	4939 868	11.818	- 0.001
46 52	8	4939.416	11.366	0.000
51.20	8.5	4938.997		+ 0.003
58.43 double		4938 350 (1R)	10.947 10.300	+ 0 005
63.44	I	4937.902	9.852	+ 0.008
67.67	6	4937.524	•	+ 0.010
7 ⁰ ·79	I	4937.245	9.474	+ 0.012
74 9 ²	0.8	4936 876	9.195 8.826	+ 0.013
78 99	5	4936.512		+ 0.015
84.56	5	4936.015	8.462	+ 0.016
104.76	10	4934.214	7.965	+ 0.019
106.06	I	4934.054	6.164	+ 0.021
112 12	8	4933.514	6.004	- 0.018
113.77	I	4933.367	5.464	- 0.015
126.36	2.5	4932.246	5.317	- 0.015
130 11	limite	4931.911	4.196	- 0.011
137.04	3	4931.296	3.861	- 0.001
140.63	2	4930.977	3.246	- 0.008
146.15	7	4930.486	2.927	- 0.00 ₇
168.41	3	4928.511	2.436	— 0.006
173.61	7	4928.050	0. 461	<u> </u>
178.67	5	4927.601		
186.88	0.5	4926.873	- 0.449	0.000
192.96	0.5	4926.334	1.177	100.0
199.60	6	4925.746	1.716	100.0
202.94 double	2	4925.740 4925 522 (2R)	2.304	+ 0 001
208.52 double	8 et 1	4924.956 (1R)	2.528	+ 0.073
213 93	I	4924.478	3 094	+ 0.002
218.13	9	4924.107	3.572	+ 0.002
226.94	I	4923.329	3.943	+ 0.002
230.72	0.8	4922 995	4.721	+ 0.003
236.94 double	7 et 2	4922 993 4922 446 (1R)	5.055	+ 0.002
242.41	4	4922 440 (1R) 4921.963	5.604	+ 0 002
251.67	3	4921.903	6.087	- 0.004
256.91 estpée	10	4920.685	6.903	+ 0.002
-		4920.003	7.365	+ 0.001

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λ ₀) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
264.15	3	4920.047	— 8 oo3	+ 0.001
274.07 estpe	. 10	4919.174	8.876	- 0.020
277. 34	5	4918.886	9.164	- 0.001
281.24	8	4918.543	9.507	- 0.010
285.25	7	4918 190	9.860	- 0.001
294 13	8	4917.410	10 640	- 0 002
303.21	0.2	4916.660	11.490	+ 0.048
305.13	0.2	4916 426	11.624	- 0.022
310 33	0.2	4915 952	12.098	- 0.041
317.30	0.2	4915.414	12.636	+ 0.031
325.04	0.2	4914.702	13.348	- 0.004
326.14	0.2	4914.583	13 467	- 0.027
331.33	6 5	4914.150	13.900	- 0.007

PLANCHE V. — DESSIN Nº 9.

Log. A = $\frac{2.9396920}{}$			Log. B = $\overline{6}$ 4642621	
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
11.33	6.5	4914.150	+ 14.055	+ 0.006
15.27	6.5	4913 803	13.708	+ 0.006
20.88	I	4913.311	13.216	+ 0.007
22 88	I	4913.157	13 . 062	+ 0.029
27.18	1	4912.666	12.571	+ 0.011
31.18	I	4912.362	12.267	— o.o36
33.47	5	4912.199	12.104	+ 0.002
36.15	5	4911 963	11.868	+ 0.001
38.95	2	4911.717	11.622	+ 0.001
42.85	5	4911.374	11.279	0.000
49.92	7	4910.753	10.658	0 000
52.74	7	4910.505	10 410	- 0.001
56.24	7	4910.198	10.103	- 0 001
63.44	6	4909.566	9•471	- 0 002
66.96	lımite	4909.283	9.188	+ 0.026
72.62	lımite	4908.784	8.689	+ 0.015
73.62	lımite	4908.673	8.5 ₇ 8	- 0.002
78.92	5	4908.209	8.114	- 0.002
82.24	6	4907.918	7.823	— 0.002
87.08	I	4907 494	7.3 ₉₉	- 0.012
99.97	0.5	4906.316	6.221	— o.o53
				3

D 111		_		
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
112.05	5	4905.310	+ 5.215	— 0.003
120 21	7	4904.597	4.502	- 0.002
132.76	9	4903 502	3.407	- 0.002
143.11	o 3	4902.562	3.467	 0.040
145.72	limite	4902.416	2.321	+ 0.042
147.72	limite	4902.257	2.162	+ 0.058
152.53	l im ıte	4901.793	1.698	+ 0.013
159 68	I	4901.152	1.057	 0 047
165.33	I	4900.648	o 553	- 0.034
169.52	7	4900.301	0.206	+ 0.001
171.88	7	4900 095		
175.86	0.3	4899.702	- 0.393	- 0.047
211.85	5	4896.625	3.470	+ 0.004
233.56	0.8	4894.743	5 352	+ 0.006
235.54	limite	4894 551	5.544	— 0.023
242.38	I	4893.997	6.098	+ 0.024
253.35	. 6	4893.030	7.065	+ 0.006
268.93 est	je IO	4891.683	8.412	+ 0.007
277.46	10	4890.948	9.147	+ 0.010
297.28 dou		4889.240 (2R)	10.855	+ 0.013
302.49 dou		4888.764 (2R)	11.331	+ 0.014
307.74	limite	4888.344	11.751	+ 0.020
312.81	limite	4887.879	12.216	, — 0.008
317.11	0.5	4887.549	12.446	+ 0.013
318.55	7	4887.381	12.714	- o.o11
320.80	7	4887.187	12.908	- o.oi i
324.49	0.3	4886.899	13.196	+ 0.019
328.53	7	4886 522	13.5 ₇ 3	- 0.009

PLANCHE V. — DESSIN N $^{\circ}$ 10.

Log. A = 2.9286671			$\underline{\text{Log. B}} = \overline{6}.7602$	713
Positions	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ ~ λ ₀) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
8 53	7	4886.522	+ 14.190	+ 0.019
12.87	2	4886.132	13.800	+ 0.005
15.13	3	4885.955	13.623	+ 0.024
18.78	7	4885.620	13.288	+ 0.005
22.91	7	4885.264	12.932	+ 0.007

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ - λ _O) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
26.49	0.2	4884.984	+ 12.652	+ 0.037
28.29	3	4884.779	12.447	+ 0016
34.65	0.5	4884 242	11.910	+ 0.001
39.14	7	4883.867	11.535	+ 0.001
42.12	limite	4883.651	11.319	+ 0.055
50.12	limite	4882.891	10.559	- 0.014
56.77	7	4882.336	10.004	+ 0.004
61.98	7	4881.904	9.572	+ 0.034
63.78	7	4881.739	9.372 9.407	+ 0.034
66.87	o.5	4881.448	9.407	- 0.001
70.28	0.5	4881.128		
75.31	0.5	4880.715	8.796 8.383	— o o37
80.73	0.5	4880.225		- 0.021
102.55	10		7.893	- 0.044
106.55	0.5	4878.360 (2R)	6.028	+ 0.056
108.91	3	4878.033	5.701	- 0.022
108.91		4877.772	5 440	— o o61
	2 5	4876.666	4.334	— o.o35
123.38		4876 586	4.254	+ 0 029
126.02	0.3	4876.384	4.052	0.006
129.24	6	4876.060	3.728	- o.o55
134.29	5.5	4875 671	3.339	— o.o13
139.79	5	4875.215	2.883	0.000
142 74	5	4874.976	2 644	- 0012
147.64	4 _	4874.544	2.212	- 0.002
150.81	4.5	4874.196	1.864	+ 0.005
154.69	I	4873.935	1 6o3	110.0
158.24	7	4873.630	1.298	- 0.013
161.74	3	4873.440	1.108	- 0.002
173.69	10	4872.332		
175.44	5	4872.112	- 0.220	— 0.07 I
183.46	10	4871.512	0.820	+ 0 008
189.57	8	4870 996	т 336	+ 0010
197 66	6	4870.323	2.009	+ 0 020
205.75	3	4869.652	2.680	+ 0 034
217 70	4	4868.599	3.733	- 0 010
219.28	4	4868.451	3.88 r	— 0 025
224.24	7	4868.056	4 276	100.0
228.09	I	4867.724	4 608	— 0 009
242.76	7· ⁵	4866.465	5.86 ₇	- 0 034
251.08	5	4865.798	6.534	- 0.002
261.98	5	4864.919	7 . 413	+ 0.034
266.89	7	4864.505	7 827	+ 0 031
270.53	5	4864.160	8. 172	+ 0.003
274.68	7	4863.833	8.494	+ 0.012
287.08	5	4862.783	9.549	- 0 002
296.04	3	4862.029	10.303	- 0 007
302.56 estpé	e 10	4861.527 F	10.805	+ 0.034
316.14	2	4860.401	11.931	+ 0.039

Positions	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δ_{o} - Δ_{c}
321.82	9	4859.928	- 12.404	+ 0.034
3 2 8 59	3	4859 316	13 016	+ 0.016
339 80	2	4858 443	13 889	+ 0 047
3 49.56	5	4857.579	14.753	- 0 008

PLANCHE VI. — DESSIN Nº 11.

<u>L</u>	og. A $= \frac{7}{2.913}$	5556	$Log B = \overline{6} 6872$	640
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δ_{0} - Δ_{c}
1.82	9	4859 928		
8 59	3	4859.316		
19 80	2	4858.443		
29.56	5	4857 579	+ 11.736	- 0 017
44.38	I	4857 280	11.437	+ 0.081
46.97	3	4857 203	11.360	+ 0 057
50.57	5	4855.859	10.016	+ 0.014
53.71	6	4855 600	9 . 757	+ 0.014
59.47	4	4855.059	9.216	 o o48
73.27	2	4853 960	8.117	- 0.002
78.66	o . 8	4853.467	7.624	- 0.049
87.41	4	4852 743	6 900	- 0.048
94 47	I	4852.208	6.365	+ 0.001
95 97	I	4852.055	6.212	- 0.022
100 58	4	4851.689	5 846	- 0.012
116 56	I	485o 386	4.543	+ 0 004
119.00	limite			
121.00	limite			
123.03	1	4849.845	4.002	+ 0.005
124 00	limite			
129.03	3	4849.357	3.514	+ 0.003
132.22	3	4849.078	3 235	- 0 014
139 63	4	4848.438	2.595	- 0.044
151.16	1.5	4847.497	1.654	— o.o36
152 30	limite		·	
162.36	I	4846 571	0.728	— 0.044
171.77	3	4845.843	•	-1-1
174 84	lımite	4845.533	— o.310	— o o58
186.07	o 5	4844.688	1.155	+ 0.016
188 72	0.5	4844.498	1.345	+ 0.042

Intensités.	Positions.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
190 50	lımite			
191 50	6	4844 210	— 1 633	- o.o.8
194 50	lımite			
198 07	1.5	4843 690	2 153	— o oo i
202 26	7	4843 336	2.507	— o o 13
206 26	3	4842.980	2 853	 0 042
207.26	lımite			·
217.35	I	4842.159	3.684	+ 0 041
219 35	I	4841.977	3.866	+ 0 022
230 09	7	4841.074	4.769	- 0.00 6
337 48	8	4840 475 (2R)	5 368	— o oo4
242.45	I	4840.075	5.768	0 000
246 60	6	4839 734	6 109	+ 0 004
256 00	limite			
258.43 dou	bl e 2 et 2	4838.768 (2R)	7.075	+ 0 010
263 11	0.5	4838.404	7 . 4 ³ 9	+ 0.004
264 24	0.5	4838.277	7 566	— o o3o
270.04	0.5	4837.850	7 993	— o o13
277 59	o 5	4837 230	8.613	+ 0 005
279.59	1.5	4837.044	8 <i>7</i> 99	- 0.020
287 42	1.5	4836 423	9 420	- 0.007
288.42	o 5	4836 .3 13	9 530	— 0.039
291.37	3	4836 . 059	9 784	— 0.052
299.34	0.5	4835.471	10 372	+ 0.003
308 36	3	4834 695	11.148	— o.o45
315.18	o 8	4834.163	11 680	— o.o26
317.18	0.3	4834.019	11.824	- 0.010
323.11	o 8	4833.559	12 284	+ 0.017
325.11	0.3	4833 378	12.465	— o o13
330.42	4 5	4832.905	12.938	— 0.049

PLANCHE VI. — DESSIN Nº 12.

$Log A = \frac{2}{2} 9060846$			Log. B = 6.47708	350
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ – $\Delta_{\rm c}$
3.11	o 8	4833.559		
5 11	0.3	4833.378		
10.42	4.5	4832.905	+ 12.312	0.000
13.81	ī	4832.615	12 022	- 0.014
10.83	I	4832.099	11.506	0.039

Positions.	Intensités.	ŲR	$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δ_0 - Δ_c
23.61	I	4831.831	+ 11.238	+ 0.007
27.23	I	4831.578	10 985	+ 0.042
29.33	4.5	4831.365	10.772	0.000
37.08	limite	4830.707	10.114	- o.o28
39 . 73	limite	4830 486	9 898	- o o29
47 31	limite	4829.878	9.285	- o o25
51.66	4	4829.551	8.958	+ 0.001
55.79	5	4829.214	8 62 1	0.000
59.89	limite	4828.899	8.306	+ 0.017
74 36	I	4827.804	7.211	+ 0 022
75.25	limite	4827.637	7.04 4	+ 0.001
77.25	limite	4827 458	6.865	- 0.016
82.65	I	4827.029	6.436	— o oo ₇
88.95	o 5	4826.554	5 .961	+ 0.028
96.00	o 5	4825 907	5.414	+ 0 052
99.58	2	4825.666	5.073	+ 0.001
101.90	2	4825.530	4.937	+ 0.053
106 37	lımite	4825.145	4 552	+ 0.029
110.50	limite	4824.775	4 182	+ 0017
116 36	7	4824.325	3.732	+ 0.017
123.92 estpee	7.5	4823.697	3.104	0.000
125.85	limite	4823.489	2 896	- 0.052
133.84	0.5	4822.85 <i>7</i>	2.264	— o o3g
139.18	I	4822.52 I	1.928	+ 0.056
146 86	limite	4821.667	1 074	o.o17
153 90	25	4821.309	0.716	+ o.o31
154.90	0.5	4821.189	0.189	o.oo8
162.40	2.5	4820.593		
163.40	limite			
177.93	limite	4819.369	— I.224	- 0.023
192.47	limite	4818.217	2.3 7 6	+ 0.044
194.77	2.5	4817.988	2.605	— 0.005
199.63	limite	4817.559	3.034	- o o39
207.85	limite	4816.865	3 .72 8	0.073
217.78	0.8	4816.119	4.474	— 0.052
219.11	o 3	4816 013	4 580	- 0.021
226.55	0.8	4815.412	5.181	— o o26
228.55	0.3	4815.239	5.354	— o.o38
234.51	0.5	4814.776	5.817	- 0.024
238 39	0.5	4814.559	6.034	+ 0.070
239 86	limite	4814.451	6.142	+ 0.080
248.75	5	4813.661	6 932	0.000
252.45	r.5	4813.300	7.293	— 0.063
254.00	0.5	4813.187	7.406	-0.052
262.17	3	4812.538	8.055	 o o48
266.85	2	4812.179	8.414	— 0.033
275.13	0.5	4811.542	9.051	— o.oo8
278.55	0.5	4811.235	9.358	- 0.042

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ - λ ₀) _R	Δ_{o} - Δ_{c}
283.03	l im ite	4810 922	— 9 67 I	+ 0.002
285 48	5	4810.724	9.869	0 000
292.42	I	8410.124	1 0 469	— 0.04б
296.42	lımite			
301 86	o 8	4809.455	11 138	— o.o38
302.86	ī	4809 33 2	11.261	 о ооб
305.44	I	4809.062	11 531	- 0.070
308.26	2.5	4808.868	11.725	 o o39
310 65	2.5	4808 733	11 860	+ 0.016
315.23	2	4808.340	12.253	- 0.012
320.89	4	4807.900	12.693	- o oo i

PLANCHE VII. — DESSIN Nº 13.

	$Log. A = \frac{7}{2.895}$	52182	$Log. B = \overline{6.3877}$	7300
Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_O)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
00.89	4	4807.900	+ (1.527	— o.o36
10.32	4	4807.179	10.806	— 0.009
18 33	0.5	4806.523	10 150	- 0.009
30.01	I	4805.606	9.233	— o o23
34.15	7	4805.285	8.912	- 0.017
42.09	1	4804.706	8.333	+ 0.032
60.37	limite	4803.233	6.860	+ 0.004
62.73	4	4803.072	6.699	0 000
64.73	limite	4802.879	6 506	o.oo5
66 37	0.8	4802.709	6.336	— 0 046
85 92	3 5	4801 213	4.840	1000 +
90 72	4	4800 842	4.469	+ 0.008
92.00	1	4800 728	4.355	 0 005
101.19	5	4799.984	3.611	0.015
106.69	3.5	4799.598	3 225	— 0.023
114.91	2	4798 921	2.548	- 0.007
117.39	2	4798.724	2.351	0.008
120.72	2.5	4798 453	2.080	810.0
127 79	limite	4797 908	1.535	- 0 007
128.79	lımıte	4797.813	1 440	— o o23
144.94	limite	4797.544	1.171	- O O22
147.40	r.5	4796 373		
170.63	o 8	4794.559	1.814	0.000

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λο) π	Δ_0 - Δ_c
1 <i>7</i> 4 65	0.3	4794.165	- 2.208	— о об9
179.56	limite	4793.927	2.446	+ 0.078
189.40	2	4793.045	3 328	— o.o33
194.51	4	4792.702	3.671	+ o o25
196.51	I	4792.500	3 8 ₇ 3	- 0.021
210 71	4	4791.439	4 . 934	+ 0.030
219.19	o 8	4790.755	5.618	+ 0.019
230.44	5	4789.849	6.524	— 0.017
234.34	5	4789.528	6.845	— o.o33
241.74	4.5	4788.952	7·42 I	— o.o31
253.62	4	4788.018	8.355	 0.038
266.64 est ^{pée}	5.5	4787.003	9.3 7 0	— o.o3 ₇
270 09	5	4786.727	9.646	- 0.044
274.00	2	4786.472	9.901	+ 0.006
278.03	2	4786.145	10 228	- 0.007
281.71	I	4785.872	10.501	+ 0.007
303 42	2	4784.189	12.184	+ 0.013
311.02	7	4783.613	12 . 760	+ 0.029

PLANCHE VII. — DESSIN Nº 14.

$Log. A = \overline{2.8831540}$		Log. B = 6.280	9197	
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_0 - \Delta_c$
8.98	7	4783.6:3	+ 15.056	+ 0.021
— 3 55	r.5	4783.169	14 612	- 0.001
+ 833	o 5	4782.256	13 699	0 000
12.64	0.8	4781.913	13.356	- 0.011
16.29	0.5	4781 639	13.082	— 0.003
24.07	lımite	4781.007	12.450	- o.o36
26.00	limite	4780.640	12.083	- 0.023
35 38	4.5	4780.169	11.612	- 0.026
42.12	4	4779 634	11.077	+ 0 006
53 53	limite	4778 767	10.210	- 0 007
57.04	0.5	4778 441	9.884	- 0.066
66.5 ı	limite	4777.780	9.223	+ 0.002
81.71 doub		4776.259 (2R)		+ 0 005
86. ₇ 3 doub	le 1 et limite	4776.612 (1R)	7.702	+ 0.036
98.73	limite	4775.330	6.773	+ 0 012
106.37	limite	4774.728	6.171	+ 0.012

Positions.	Intensités.	$\lambda_{ m R}$	(λ-λο)π	$\Delta_0 - \Delta_c$
				+ 0 042
114 39	0 5	4774.153	+ 5.596 5.048	- o oo8
120.75	0 5	4773.605	•	0.004
124.08	o 5	4773 333	4.77 ⁶	0.004
128 66	7 _	4773 007	4 450 3.802	100.0
137.00	0.5	4772.359		+ 0.027
143.42	4 _	4771.903	3.346	+ 0.027
146 11	4 5	4771 664	3.107	0.016
151 02	o 5	4771.279	2.722	— 0.010 — 0.06 0
155.63	o 8	4770.881	2.324	— 0.000 — 0.016
165.27	т 5	4770.188	1 631	
167.36	I	4769.991	1.434	- o.o38
182.41	I	4768.891	0 334	- 0.002
186.81	7	4768.557 (2R)		
	lımite			
	lımite			
	limite			
	lımite			
193 41	I	4768 0 40	— o 5o8	- 0 004
206.73	ľ	4767 .0 66	1.491	- - o.o3 r
	limite			
	limite			
	limite		3.0	
212.15	7	4766.621	1.936	- 0.001
218.98	7	4766 .0 50	2.507	— o.o51
224.84	6 5	4765.652	2.ე05	- 0.002
237 <i>7</i> 0	2	4764.720	3.837	+ 0.047
241.22	2	4764.479	4.078	+ 0.074
245.09	7	4764 108	4.449	- 0.002
259 84	τ.5	47 6 2.96 <u>9</u>	5.588	- 0.018
262 40	r . 5	4762.820	5.7 ³ 7	+ 0.027
2 65 33	7	4762.567	5 990	- 0.002
276.58	6	4761 718	6.839	0.005
280 93	I	4761 439	7.118	+ 0.057
282 73	o 8	4761 294	7 263	+ 0 049
306.20	3	4759.463	9.094	+ 0 001
321 45	3	4758.308	10 249	0.004
327.95	4 5	47 ⁵ 7 771	10 786	— o o3g
342.60	5	4756.805	11.852	+ 0.006

PLANCHE VIII. - DESSIN Nº 15.

Log. A = 2.8739314		$Log. B = \overline{6.1091}$	159	
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λ ₀) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
1.45	3	4758.308		
7.95	4	4757.771		
22.60	5	4756.705	+ 12.132	+ 0.012
28.22	5	4756.300	11 727	+ 0.030
33.47	0.8	4755.889	11.316	+ 0.013
35.29	I	4755.714	11.141	- 0.024
45.44	3	4754.949	10.376	— 0.026
55.22	7	4754.225	9.652	- 0.016
76.82	3	4752.613	8.040	- 0.006
81.17	3	4752.289	7. 716	- 0.004
85.09	I	4752.012	7 4 ³ 9	+ 0.013
94.15	1.5	4751.279	6 . 706	— o.o38
109.97	3	4750.139	5.566	+ 0.006
114.21	2.5	4749 849	5.276	+ o.o36
134.11	6	4748.325	3.552	+ 0 002
165.71	6	4745.992	1.419	+ 0.038
171.76	o.8	4745.500	0.927	- 0.002
174.17	0.8	4745.325	0.752	+ 0.003
177.81	lımite	4745.020	0.447	- 0.034
180 1 <i>7</i>	o 8	4744.826	0.253	- 0.046
184.17	4.5	4744.573		
205.62	2.5	4742.979	— 1.594	+ 0 010
222.59	5	4741.718	2. 85 I	+ 0 017
225 00	limite	4741.538	3.035	+ 0.017
227 67	o.8	4741.260	3.3 ₁ 3	- 0.061
230.17	0.8	4741.131	3.442	- 0.004
236.17	o 8	4740.668	3.905	- 0.019
237. 96	I	4740.530	4.043	- 0.023
2 3 9.96	0.5	4740.349	4.224	— 0.055
254.88	4.5	4739.291	5.282	+ 0.001
274.40	2	4737.817	6. ₇ 56	— 0.01 <i>7.</i>
278.30	3	4737.540	7.033	— 0.003
286.05	9	4736 963	7.610	— 0.002
298.39	4	4736.03 I	8.542	— o.o15
321.67	2.5	4734 283	10 290	- 0.029
323.17	1	4734.169	10.404	— o.o31
3 27 91	7	4733.779	10.794	 0.068

PLANCHE VIII. - DESSIN Nº 16.

 $Log. A = \frac{1}{2.8677181}$

Log. B = $\overline{6}.2466315$

	6. /		<u> </u>	
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	($\lambda - \lambda_0$) _R	Δ_0 - Δ_c
791	7	47 ³³ .779	+ 12.600	+ 0.001
9.54	o.5	4733.604	12.425	- 0.053
22.65	4 5	4732.640	11.461	— o o43
32.28	4	4731.984	10.805	+ 0.017
36.51	7	4731 651	10.472	+ 0.002
43.13	3	4731.177	9.998	+ 0.015
46.97	5.5	4730.897	9.718	+ 0.020
56.01	5	4730.212	9.033	+ 0.005
60.66	5	4729.864	8.685	+ 0.003
66.16	3	4729.460	8.281	+ 0.006
67.16	I	4729.381	8 202	+ 0.002
70.23	3	4729.207	8.028	— o o o7
72.90	I	4728.966	7.787	+ 0014
75.91	6	4728.732	7.5 53	+ 0.003
81.25	1	4728.349	7.170	+ 0.015
85.16	I	4728.032	6.853	- 0.012
90 79	8	4727 629 (2R)	6.450	0.000
95.11	o 8	4727.337	6.158	+ 0.030
109.23	ι	4726.327	5. 148	- ├ 0.063
111.36	I	4726.133	4.954	+ 0.025
117.23	limite	4725.647	4.468	— o o25
123.23	lımite	4725.278	4.099	+ 0.049
131.82	3	4724.592	3.413	0.000
139 .5 1	limite	4724.078	2.899	+ 0 053
148.46	3	4723.359	2.180	<u> </u>
149.46	3	4723.294	2 115	+ 0 009
154.48	1.5	4722.940	1.761	+ 0 021
162.10	5	4722.342	1.163	— o.o15
178.07	4 5	4721.179		
193.76	0.8	4719.862	— 1.317	— o o 13
198.07	0.8	4719 690	1.489	- 0.014
213.05	5	4718.601	2.578	- 0.001
224.3 I	3.5	4717-756	3 423	<u> </u>
227.57	0.5	4717-494	3.685	— 0.03 9

4715.946

4715.474

4715.089

4714.599

4714.248

4713.989

5.233

5.705

6.090

6.580

6.931

7.190

0 000

0 000

- 0.008

+ 0.040

- 0.017

+ 0.020

249.16

255.47

261.37

267.49

272.04

276 07

6

0.8

0.8

7

I

02

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_0 - \Delta_c$
284 14	0 2	4713.361	 7.818	- 0 016
290.84	0.2	4712 883	8 296	- 0.002
293 57	02	4712 677	8.502	0.008
297.34	0 2	4712 433	8 74 6	+ 0 026
299.38	3 5	4712 260	8 919	+ 0 006
307.58	3	4711 665	9.514	+ 0.014
323 78	6	4710 471	10.708	0 000

PLANCHE IX. — DESSIN Nº 17.

$Log. A = \overline{2.8578803}$		Log. B = 6.1861084		
Positions.	Intensités	$\lambda_{\mathbf{R}}$	($\lambda - \lambda_0$) _R	Δ_0 - Δ_c
3 . 78	6	4710 471	+ 11 830	- o.oo5
11.81	5	4709.896	11.255	+ 0 002
20.33	6	4709.271	10.630	- 0.001
22.08	limite	4709.153	10.512	+ 0.005
26.34	4 5	4708.846	10.205	+ 0.006
35.48	4.5	4708.196	9.555	+ 0.019
42.45	4	4707.672	9.031	0 000
45.33	6	4707.457	8 8 1 6	- o oo6
55.41	3	4706 <i>7</i> 30	8 089	- 0.002
70.28	3.5	4705.641	7.000	— o.o15
77 63	4	4705.131	6 490	+ 0.007
84.15	2	4704 658	6 017	+ 0 006
93.07	4	4703 994	5.353	- 0 013
104 38 est		4703 1 <i>77</i>	4.536	+ 0012
110.18	0.5	47 02.7 79	4 138	+ 0.009
113.95	0.5	4702.473	3.832	— o o23
119.29	o 5	4702 083	3.442	- o.o28
124.74	3	4701.714	3.0 7 3	- 0.004
127 18	3	4701.535	2.894	- 0.005
131.26	2.5	4701.231	2. 590	- 0.015
137.45	0.5	4700.795	2.154	— 0.005
144.07	5	4700.337	1 696	- 0.015
155.18	5	4699.511	0.870	- 0.010
162.69	2	4698.946	o 3o5	— o o33
164.76	3	4698.798	0.157	- 0.032
167.38	5	4698.641		
182.29	0.5	4697.578	— 1.o63	+ 0.012

Positions	Intensités	λ_{R}	(λ – λ_0) $_{\rm R}$	Δ_0 - Δ_c
186 85	3	4697 230	— I.41 I	— o oo8
213.76	limite	469 5 331	3 310	+ 0.030
216.78	lımıte			0
217.21	3	4695 042	3 599	- 0.018
228 60	1.5	4694.298	4 343	+ 0.065
230.00	2 5	4694.125	4.516	— o oo8
233.50	I	4693 852	4 789	- 0 023
238.65	1.5	4693 . 513	5.128	+ 0 002
248 08	3	4692.829	5.812	- 0 004
262.68	ı	4691 <i>777</i>	6.864	- 0.008
265 34	9	4691.589 (2 R)	7 052	0 005
268 18	limite	4691.372	7.269	810.0
271 28	limite	4691.149	7.49^{2}	0 0 1 8
279.20	I	4690,555	8 o36	F 0 006
282 58	5	4692.317	8.324	— 0.03g
294.06 dou t	ole 3	4689.585 (2R)	9.056	-⊢ o.o52
306.38	0.5	4688 65 t	9.990	0 001
307.38	1	4688.554	10.087	- 0 024
310.00	4	4688.357	10.284	— o.o34
315.38	0.5	4687 981	10.660	— o o24
321.47	5	4687 540 (2R)	101.11	— 0 029

PLANCHE IX. — DESSIN Nº 18.

Log. A = $\overline{2.8499713}$ Log. B = $\overline{6.4301880}$				
Positions. 1.47 17.13 30 42 33 71 40.13 43 35 47 13 54.28 68.13 71.29 74.51 77.48 81.61	Intensités. 5 5 6 limite 3 limite limite 5 2 3 3.5 5	λ _R 4687.540 (2R) 4686.395 4685.452 4685.208 4684.774 4684.532 4683.745 4682.746 4682.529 4682.295 4682.088 4681.781	(λ - λ ₀) _R + 12.246 11.101 10.158 9.914 9.480 9.238 9.098 8 451 7.452 7.235 7.001 6.794 6.487	Δο - Δc + ο ο 19 - ο ο ο 08 + ο ο 017 + ο ο 06 - ο ο 08 ο ο 0 000 - ο ο 03 - ο ο 03 - ο ο 02 - ο ο 014

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δ_{0} - Δ_{c}
83 61	2	4681.646	+ 6.352	- 0.007
92.03	2	4681.037	5.743	- 0016
93.53	2	4680 926	5.632	- 0.020
97.33 est ^{pée}	3.5	468o 658	5.364	- 0 017
100.13 estpée	3 5	4680.480	5.186	+ 0.004
102.81	3	4680 317	5 024	+ 0032
104.63	0.5	4680.157	4.863	0.001
114.86	5	4679.409	4.115	 0. 019
120.69	6.5	46 7 9 027	3 . 733	+ 0.013
130.07	5.5	4678.347	3.053	0 000
138 8o	I	4677.77 ⁵	2.481	+ 0 048
147.54	0.5	46 77.0 96	1 802	- 0.011
151.54	o 5	4676 829	1.535	+ 0 005
157.50	0.5	4676 409	1 115	- - 0.008
158 50	0.5	4676.338	1.044	+ 0.008
166.55	I	4675 <i>7</i> 85	0.491	+ 0.025
169.13	I	46 7 5.569	0.275	- 0.018
173.13	4	4675.294		
178.13	2	4674 . 933	— o.361	- 0.007
179 43	2	4674.829	o 465	- 0 019
184.58	1.5	4674 484	0.810	0.000
187.03	4	4674 275	1.019	— o o36
200.11	7	4673.403 (2R)	1.891	+ 0017
205.31	2.5	4673.012	2.282	0.000
212.52	6	4672.509	2.785	- 0.001
222.02	0.5	4671.858	3.436	+ 0018
225 63	2	4671 601	3.693	+ 0.016
239.72	6	4670 590	4.704	- 0.001
2 43.47	2	4670.346	4.948	+ 0.018
255.33	I	4669 504	5. ₇ 90	+ 0 011
257.13	6	4669 354	5.940	— 0.0 13
265.63	3	4668. ₇₄₉	6.545	- 0.020
272 51	8	4668.287 (2R)	6.993	100.0
2 77. 61	2	4667.941	7.353	+ 0.014
280.21 (estpe		4667.768	7 526	+ 0.023
282.31 \alin		4667.626	7 668	+ 0 029
285.38	3	4667 381 (2R)	7 913	0 000
289.28	3	4667.113 (2R)	8 181	+ 0.008
292.48	3	4666.854 (2R)	8.440	— 0.030
295.68	3	4666.655	8 639	- 0.004
299 93	2	4666.333 (2R)	8 9 6 1	- 0.028
304.33	2	4666.076	9 2 1 8	+ 0.023
319.88	5.5	4664 965	10 329	+ 0.001

PLANCHE X. — DESSIN Nº 19.

	Log. $A = \frac{1}{2.841}$	1601	Log. B = 6.8769	355
Positions	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λ ₀) _R	$\Delta_0 - \Delta_c$
- 0.12	5.5	4664.965	+ 10.222	- 0.059
+ 13.81	4	4663.999	9.256	- 0.029
21.00	4	4663.492	8. ₇₄₉	- 0.024
29 07	lımite	4662.930	8.187	- 0 012
32.91	limite	4662.693	7.950	+ 0.024
40 15	4.5	4662 149	7.4 0 6	- 0.005
46.47	4	4661.712	6. 9 69	+ 0.006
55 43	2.5	4661.083	6 340	+ 0011
62.31	2	4660 602	5.859	+ 0.016
92.15	I	4658.4 7 5	3.732	— 0.0 13
103.06	1	4657 . 766	3.023	+ 0 046
108.61	2.5	4657.380	2.63 ₇	+ 0.048
112.35	1.5	4657 154	2 411	+ 0.084
119.24	5.5	4656 644	1.901	+ 0.055
123.27	o.5	4656.365	1.622	+ 0.055
125.07	0.5	4656 228	1 485	+ 0.045
128.86	0.5	4655.967	1.224	+ 0 048
130 86	0.5	4655 832	1 089	+ 0 055
136.95	limite	4655.419	0.676	+ 0.062
145.78	10	4654.743 (2 F	₹)	
152 46	0.5	4654.327	— 0 4 1 6	+ 0.047
161 84	I	4653.6 ₇₇	1.066	+ 0.046
163.84	I	4653.551	1.192	+ 0.058
181.27	7	4652.343	2 400	+ 0.052
193.76	6	4651 461	3.282	+ 0 023
196.43	limite	4 65 1 290	3.453	+ 0.041
199 43	limite	4651.121	3.622	+ 0.078
201.43	limite	4650.985	3.758	+ 0 079
205 15	limite	4650 725	4 018	+ 0.074
208.31	0.5	4650 488	4.255	+ 0 053
211.16	limite	4650.296	4.447	+ 0.056
21261	0.5	4650.193	4.550	+ 0 052
215 46	0.5	4649 992	4.751	+ 0.046
218.31	0.5	4649.819	4.924	+ 0.068
221.28	0.5	4649.613	5.130	+ 0.064
229.28	0.5	4649 031	5.712	+ 0 028
232.12	7	4648 835	5 908	+ 0 025
241.94 e	est ^{pee} 3	4648 135	6.608	- 0.007
249.98	. 7	4647.617	7.126	+ 0.010
261.44 e	est ^{pée} 3	4646.815	7.928	— 0.00б

Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
268.28	7	4646.347	— 8.396	- 0 011
273.88	o 3	4645 965	8 <i>77</i> 8	- 0.016
278 76	o 3	4645 671	9 072	+ 0 019
280.52	o 3	4645.483	9.260	— o o5o
282 52	0.3	4645 368	9.375	— 0.030
204 02	limite	4644.572	10 171	 0.058
307.66	7	4643.645	11 098	— o o66
316.79	7	4643.005		
320 31	0.5	4642 76 5		

PLANCHE X. — DESSIN N $^{\circ}$ 20.

Log. $A = 2.8309594$		$\underline{\text{Log. B} = \overline{6} 412}$	5300	
Positions.	Intensités	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_O)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
 12 44	7	4643.645	+ 10.545	- 0.002
— 3 2 I	7	4643 005	9.905	- 0 010
+ 031	o 5	4642.765	9 665	- 0 009
20.56	2.5	4641.390	8 290	+ 0 003
23 81	lımıte	4641.147	8.047	- 0.019
34 02	1.5	4640.468	7.368	+ 0 002
39 40	2	4640.119	7 019	+ 0.019
44.72	2 5	4639.846	6.746	<u> </u>
47 7 ¹	3	4639.538	6.438	+ 0.005
50 2 ī	0.5	4639 353	6 253	- 0.010
5 3 46	0.3	4639.132	6.032	<u> </u>
57.21	o 5	4638.879	5.779	 o oo6
59 46	o 3	4638.709	5 609	- 0.022
67.37	7	4638.193	5.093	+ 0 008
70 87	o.5	4637.938	4.838	- 0.016
74 37	7	4637.685	4 585	— 0.030
77 35	ı	4637.474	4.374	- 0.03 ₇
79.5 I	ı	4637 352	4.252	— o o 13
92.02	1	4636 50 1	3.401	- o.o13
99 20	6	4636.027	2 927	0 000
102 31	0.8	4635.803	2.703	- 0.011
107 35	0.8	4635 489	2.389	+ 0017
r-15 85	5	4634.895	1.795	0.000
125.45	6	4634.254	1.154	1100+
129 93	3	4633.950	0.850	+ 0.012
137.86	0.3	4633.432	0.332	- 0.010

Positions.	Intensités.	λ_{R}	(λ-λ _O) _R	Δ_0 - Δ_c
142.31	7	4633.100		
153 80	0.5	4632.320	— o. ₇ 80	- 0.001
163.81	0.3	4631.663	1.437	+ 0.019
177.50	0.5	4630.740	2.360	+ 0.029
183.62	6.5	4630.306	2.794	+ 0.001
195.39	7.5	4629.521	3 .5 79	+ 0010
211 31	0.5	4628.448	4 652	1100 +
212.31	I	4628.335	4.765	— o.o35
221.84	2	46 27.7 26	5.374	- 0.002
224 54	2	4627.547	5 553	+ 0.001
226.86	2	4627.392	5.708	+ 0.002
236.97	I	4626.718	6.382	+ 0.009
242.37	7	4626.358	6.742	+ 0.012
246.31	lımite	4626.096	7.00+	+ 0.015
255.10	lımite	4625.489	7.611	— 0.002
259.03	7	4625.227	7 . 873	— 0.006
268.53	o.3	4624.594	8.506	+ 0.005
273 47	0.3	4624 265	8.835	+ 0 010
281.07	0.5	4623.759	9.341	+ 0.011
288 o5	5	4623 279	9.821	0.008
293 31	2	4622 929	10.171	+ 0.002
297.84	3	4622 627	10.473	+ 0.003
305.34	5	4622.128	10.972	+ 0.006
310 32	limite	4621 795	11 305	+ 0.007
31788	lımite	4621.299	108.11	+ 0.056
326.69	5	4620.693	12.407	- 0.002

PLANCHE XI. - DESSIN Nº 21.

Log. A = $\frac{2.8155030}{1.81500}$		$Log. B = 6.41179^34$		
Positions	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
6.69	5	4620.693	+ 9.241	÷ 0.031
21.77	2	4619.711	8.259	+ 0.046
25.39	75	4619.468	8.016	+ 0.043
32.47	7.5	4618.971	7.519	+ 0.012
36 46	lımite	4618.688	7.236	0.008
38.70	limite	4618.536	7.084	- 0 011
44.20	0.5	4618.150	6.698	- o.o35
				j j

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ - λ_0) R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
45 . 70	0.5	4618.046	+ 6.594	— o.041
55.20	4	4617 452	6.000	- 0.009
65 oo	3	4616.804	5.352	0 011
67.76	limite	4616.644	5.192	+ 0.010
72.56	6	4616.305	4.853	— 0.0 13
80.52	2.5	4615.743	4 291	— 0.052
101.28	I	4614 388	3.936	— 0.043
105.58	I	4614 097	2.645	-0.052
115.55 dou	ble 6 et 3	4613.465 (2R)	2.013	— o o3o
146.76	8	4611.452 (2R)		
163.31	o 5	4610.365	— 1.08 ₇	— 0.005
167 09	I	4610.088	1 364	— o o36
177.34	o 3	4609 447	1 005	 o oo8
185 76	limite	4608.887	2.555	<u> </u>
188.56	limite	4608.700	2 752	— 0.023
201.82	5	4607.83 I	3 62 1	- 0.029
206.63	3	4607.510	3 .9 42	· - 0.036
221.30	1.5	4606 574	4.878	— o o 18
224 00	1.5	4606.404	5.048	— o.o13
233.88	3.5	4605. 769	5.683	— 0.00б
237.50	0.5	4605 536	5.916	— o oo4
242.97	5.5	4605.171	6.281	- 0.014
249.77	2	4604 <i>7</i> 35	6.717	- 0 009
259.20	I	4604.137	7.315	+ 0.005
260.92	I	4604.031	7.421	+ 0.010
268.80	0.5	4603.525	7.927	+ 0 015
2 74 - 79	7.5	4603.126	8.326	+ 0.003
289.53	6	4602.183	9.269	+ 0.014
306.18	2	4601.114	10.338	+ 0.021
309.05	5.5	4600.932	10 520	+ 0.024
315.14	3.5	4600.541	10.911	+ 0.026
319.42	1.5	4600.279	11.173	+ 0.040
323.45	5	4600 018	11.434	+ 0.037

PLANCHE XI. — DESSIN N° 22.

$Log. A = \overline{2.7950177}$			Log. B = $\overline{6.3274}$	611
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λο) κ	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
3.45	5	4600.018	+ 9.892	+ 0.020
13.06	0.3	4599.408	9.282	+ 0.016
20.80	0.5	4598.928	8.792	+ 0.013

Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δ_{o} - Δ_{c}
	limite	4598.579 (2R)	+ 8.453	— o oog
26.14		4598 303	8 177	+ 0 004
30.43	5	4598.050	7 924	+ 0.009
34. 5 9	3		7.803	+ 0.009
36.5 r	3	4597.929	7.434	+ 0 001
42 34	1.5	4597 560	7.304	+ 0 024
44.40	1.5	4597.430	6.954	— o oo3
49 94	0.5	4597.080	6 627	- 0 001
55.11	2	4596 753		+ 0 004
5 <i>7 7</i> 0	2	4596 589	6.463	- 0.008
62 9 7	7	4596.245	6.119	o o26
70.9 9	I	4595.770	5 644	
74.65	5.5	4595.540	5.414	+ 0 015
82.17	1.5	4595.067	4.941	+ 0 007
86.10	0.3	4594.820	4 694	+ 0.009
93.98	6	4594.297	4 171	- 0011
97.85	I	4594.057 (2R)	3.931	— 0 012
103.59	2	4593 704	3.578	+ 0.008
109.07	0.5	4593.355	3 229	— o oo8
117.32	8	4592.840	2.714	- 0.007
119 80	limite	4592.707	2.581	+ 0017
127 37	2	4592.231	2.105	- 0 008
135.93	ı	4591.693	1.56 ₇	+ 0.010
137.83	6	4591.574	1.448	+ 0 010
147.52	3	4590.965	o .839	+ 0 006
160 87	6	4590.126		
171.38	limite	4589 468	— o б 5 8	— o oo3
181.10	0.8	4588.859	1 267	— о ооб
188.73	6	4588.381	1 745	0.008
196.55	r.5	4587.898	2.228	0.005
206 00	6	4587.308	2 818	- 0.007
218.10	3	4586.552	3.574	- 0.011
220.41	3	4586.408	3.718	- 0 012
226.19	7	4586 047	4.079	— 0.014
	o 5	4585 519	4 607	- 0 002
234.88 244.01 est ^p		4584.951 (2R)	5.175	- 0 004
244.01 est.		4584.018	6.108	<u> </u>
258.99 est	•	4583.58 ₇	6 539	1100 +
266.25	2 0.5	4583.296	6 830	+ 0.010
270.94	5	4583.011	7.115	- 0010
275.54		4581.693	8.433	+ 0 005
296.78	7	4581.575	8.55 r	- 0 028
299.05	7	4581.369	8.757	+ 0.027
302.38	0.5		9.364	+ 0.026
312 19	3	4580.762	9.504 9.536	+ 0.020
314.97	3	4580 590	-	+ 0.029
320.82	5	4580.228	9.898	F 0 023

PLANCHE XII. — DESSIN Nº 23.

Ī	$\log A = \frac{1}{2} 783$	2284 1	Log. B = $\overline{6.445}$	4 ³ 7 ⁶
Positions.	Intensités.	$\lambda_{ m R}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
0.82	5	4580.228	+ 8.953	- 0.010
4.37	1.5	₄ 579.994	8 719	— o oo5
6.75	limite	4579.862	8.587	— 0.00 9
12.54	I	4579.506	8.231	+ 0012
24 99	7	4578.732	7.457	0.000
47 46	3.5	4577 356	6.08 r	- 0.001
61 16	6	4576.512	5.237	- 0.004
70.25	1	4575.964	4.689	- 0.004
73 93	0.5	4575.726	4.451	+ 0 021
76 18	0.5	4 5 75 600	4.325	— o oo5
81 29	0.5	4575 286	4011	- 0.001
8 ₇ 5 ₉	ő	4574.899	3 624	- 0.002
95 71	4	4574 396	3 121	+ 0 009
99.92	I	4574 168	2.893	- 0.020
122.76	0.3	4572.766	1.491	0.008
127.81	0.3	4572.457	1 182	- 0.006
132.72	8	4572.156	0.881	— 0.004
138 05	3	4571.849	0.574	+ 0.021
141.84	I	4571.618	0.343	+ 0 021
147.15	7	4571.275		
150.10	o 3	4571 095	— o 18o	- o.oo
164 80	0.3	45 <i>7</i> 0.199	1.076	— о ооб
171.55	3	4569.788	1 487	— o oo5
184 80	5	4568.987 (2R)	2.288	— 0.006
192 83	3	4568.499	2.776	- 0.009
207.89	o 3	4567 . 584	3.691	- 0.014
216.75	5	4567.046	4 229	— o o13
222.87	3	4566.693	4 582	+ 0 001
236.94	6	4565.842	5.433	— 0.005
239.15	7	4565 688	5.58 ₇	 0.026
250 82	0.5	4565 002	6.273	- 0 010
252.92	3	4564.8 ₇ 5	6 400	– 0.010
268.38	7	4563 939	7.336	— 0.009
274 51	0 5	4563.599	7.676	- 0.009
277 60	0.5	4563.413	7.862	+ 0.010
287.54	o 5	4562 814	8.461	+ 0.006
292.06	I	4562 541	8.734	+ 0 004
302.55	0.5			
307.83	3	4561.591	9.684	+ 0.009
315.57	I	4561.145	10.130	+ 0.015

Positions 317.15 319 67 326 90 330.07	Intensités. I O.5	λ _R 4561.044 4560 892 4560.457 4560.206	(λ - λ ₀) _R — 10.231 10 383 10 818 11.009	$\Delta_0 - \Delta_0 + 0.009 + 0.007 + 0.004 + 0.002$
---------------------------------------	---------------------	--	--	---

PLANCHE XII. — DESSIN Nº 24.

$\overline{\Gamma}$	og. $A = \frac{1}{2.770}$	5035 <u>L</u>	$\log. B = \overline{6} 1418$	065
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
6 90	0.5	4560.457	_	
10.07	4	4560.266	+9.324	+ 0 024
12.80	0.5	4560.102	9.160	+ 0.022
34.05	5	4558.827	7.885	+ 0.008
43.19	I	4558 2 85	7.343	+ 0.008
57.02	τ	4557.457	6 5 1 5	0 000
62.88	τ	4557.107	6.165	- 0.017
69.37	0.5	4556.719	5. <i>777</i>	- 0.007
76.27	6	4556 306	5.364	- 0 011
8o 59	6	4556.0 63	5.121	+ 0.002
87.32	5	4555.662	4.720	0.001
95.71	3.5	4555.162	4 220	- 0.004
104 70	3	4554.626	3.684	+ 0.009
111.66	7	4554.211	3 .2 69	- 0.012
126.45	o.5	4553.346	2.404	o.oo3
128 59	o 5	4553.219	2.277	- 0.004
137.67	7	4552.679 (2R)	1.737	0.008
141.66	1	4552 460	τ.5τ3	+ 0.009
144.13	o 5	4552.314	1.372	+ 0.008
152.39	1	4551.824	0.88 ₂	-l- 0 006
159.45	ī	4551.399	o 457	— o.oo3
167.25	6	4550.942		
178.21	0.3	4550 293	- 0.64 9	- 0 001
183.33	3	4549.990	0.952	- 0.004
186.41	8	4549.808	1.134	- 0.005
189 24	2	4549.642	1.300	- 0.004
201.15	7	4548.938	2.004	- 0.007
216 71	7	4548.024	2 918	- 0.006
210 /1	ĭ	4547.401	3.548	- o.oo8
231 58	7	4547 147 (2R)	3.895	— o.oo ₇

Intensités.	Positions.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_O)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
236.85	0.5	4546.848	 4.094	+ 0.002
240.30	0.5	4546.645	4.297	+ 0.002
249.07	7	4546.129	4.813	+ 0.001
259.65	ĭ	4545 . 507	5.435	0.000
262.98	3	4545.311	5.63 ı	0.000
271.22	6	4544.826 (2R)	6.116	- 0.002
282.49	2	4544.190	6.752	+ 0.023
286.39	1.5	4543.945 (2R)	6.997	+ 0.007
305.69	1.5	4542.831 (2R)	8.111	+ 0.024
309.64	3	4542.600	8.342	+ 0.023
313.05	0.5	4542.400	8.542	+ 0.024
325.15	7	4541.690	9.252	+ 0 022

PLANCHE XIII. — DESSIN Nº 25.

Lo	og. $A = \overline{2}.758$	1825 Log	g. B = $\overline{6}.2438$	390
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ – $\Delta_{\rm c}$
5.15	7	4541.690	+ 9.889	+ 0.020
8.69	I	4541.483	9.682	+ 0.018
12.58	I	4 5 41.236	9.435	- 0.004
19.02	6	4540.880	9 .079	+ 0.013
22 58	6	4540.672	8.871	+ 0.011
27.52	limite	4540.385	8.589	+ 0.010
31 25	limite	4540.167	8.366	+ 0.007
35.04	3	4539.946	8.145	+ 0.005
38 29	limite	4539.759	7.956	+ 0.004
44.04	limite	4539.424	7.623	+ 0.003
46.76	limite	4539.263	7.462	0.000
49.19	limite	4539.124	7 323	+ 0 001
51.81 est ^{pė}	3	4538.970 (2R)	7.169	— 0.002
59.3 ₇	limite	4538.539	6 738	+ 0.004
66.27	limite	4538.138	6.33 ₇	100.0
71.32	I	45 37.845	6.044	100.0
75.53	limite	4537.592	5.791	1100 —
79.16	limite	4537.38 9	5.588	 0.005
91.45	limite	4536.6 ₇ 5	4.874	- 0.011
93.91	limite	4536.532	4.73 1	- 0.012
99.24	4	4536.222	4.42 I	— 0.005
101.79	4	4536.094	4.293	+ 0.004
105.50	3	4535.879	4.078	+ 0.002

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ - λ ο) _R	Δ_0 - Δ_c
107 88	6	4535.741	+ 3.940	+ 0.001
115.33	1.5	4535.310	3.509	- 0.001
121 49	6	4534.953	3 152	- 0.004
132.08	2	4534.340	2.539	- 0.008
135.55	7	4534.139	2 338	- 0 010
148.44	6.5	4533.419	1.618	+ 0.010
152.65	4.5	4533.176 (2R)	1.3 7 5	+ 0.010
176.47	5	4531.801		
184.70	6.5	4531.327	- 0.474	— 0.003
188.24	5	4531.123	0.678	- 0.004
191.94	6.5	4530.888 (2R)	0 913	+ 0.030
207.44	0.5	4530.020	1.781	- 0.008
212.52 estpe	<u> </u>	4529.728 (3R)	2.073	- 0.010
225.96	0.5	4528.959 (2R)	2.842	- 0.010
228.76 est ^{ple}	10	4528.798	3 003	- 0 011
231.52	0.5	4528.647	3.154	- 0.006
243 61	ı	4527.954	3 .847	— o oo8
249.23	I	4527 632	4.169	- 0.009
251.71	5	4527 490	4 311	— 0.009
258.50	4.5	4527.101	4 700	- 0.011
264.94	2	4526.732	5.069	— o o 13
267.27	5	4526.606 (2R)	5.195	— 0.006
273.29	0.5	4526.269	5.532	0.000
277.47	0.5	4526.03 I	5 <i>77</i> 1	- 0.001
290.01	7	4525.314	6.48 ₇	— o.oo3
293 82	1	4525.110	6 691	+ 0.009
298.27	I	4525.009	6.792	+ 0.009
306.38	o 5	4524.856	6 945	+ 0.007
308.69	0.5	4524.262	7. 53 9	+ 0.007
311.71	0.5	4524.090	7.711	+ 0.007
3 2 0 79	3	4523.572	8.229	+ 0.005
326.71	1.5	4523.250	8.55 ı	+ 0.019
331.56	3	4522 974	8.827	+ 0.018
334.58	6	4522.802	8.999	+ 0.017

PLANCHE XIII. — DESSIN Nº 26.

$Log. A = \frac{1}{2.7472549}$			Log. $B = \overline{6} o326590$		
	T	,	())-)-	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$	
Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	20 - 20	
o 79	3	4523.572			
6 71	1.5	4523.250			
11.56	3	4522.974		1 0	
14.58	6	4522.802	+ 8.144	+ 0 028	
16.24	0.5	4522.691	8 333	+ 0.010	
24 18	0.5	4522 240 (2R)		+ 0 002	
27.47	limite	4522.053	7.695	+ 0.010	
40 96	05	4521.304	6.946	- 0.001	
46 6 7	limite	4520.970	6.612	+ 0.004	
51.58	limite	4520.701	6.343	+ 0.005	
56 93	6	4520.397	6 . 039	0.000	
61.32	I	4520.157	5. 799	+ 0.005	
67 52	limite	4519.806	5.448	+ 0.003	
84.13	0.5	4518 8 6 6	4.508	— 0.005	
86 29	0.5	4518.753	4.395	+ 0.003	
88.64	limite	45 18.612	4.254	- 0.006	
90.49	2.5	45 18.506	4 148	100 0 +	
95 93	5	4518.198	3.840	- 0.012	
105.02	5	4517 702	3.344	+ 0.001	
111.78	3	4517 321	2.963	- 0.001	
120 56	0.5	4516.826	2.468	- 0.004	
127.46	0.5	45 16.437	2.07 9	 0.00 6	
143.92 estpee	7	4515.508	1.150	- 0.016	
160.59	5	4514.628 (2R	0.270	+ o o36	
164 77	4	4514.358			
172 18	o.3	4513.886	- 0 472	+ 0.020	
175.53	0.3	4513.754	0.604	0.003	
178 22	0.5	4513.603	0.755	- 0.003	
186.04	0.5	4513.164	1.194.	— о.ооб	
190 63	6	4512.906	1.452	0.008	
199.07	I	4512.439	1.919	— 0.003	
206 30	4	4512.063	2.295	+ 0.004	
218.62	lımıte	4511.345	3.013	- 0.009	
220.49	limite	4511.233	3.125	- 0.014	
224.79	0.5	4511.000	3.358	- 0.008	
244 38	4	4509 904	4.454	- 0.012	
² 49·79	0.5	4509 616	4.742	- 0.001	
252.66	0.5	4509.456	4.902	- 0.002	
263.44	0.5	4508.855	5.503	0.000	
270.61	7	4508.455	5.903	- 0.001	

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_0 - \Delta_c$
275.14	o 5	4508.213 (2R)	 6.145	+ 0 009
278.39	o 3	4508.027	6.331	- o.coi
280.33	0.3	4507.919	6 .4 39	+ 0.004
286.75	0.3	450 7 560	6 <i>7</i> 98	+ 0 004
289 64	o 8	4507.396	6 396	- 0.001
333.10	6	4505.003	9.355	+ 0.021

PLANCHE XIV. — DESSIN Nº 27.

Lo	og. A = $\frac{1}{2.738}$	8307 Lo	og. B = $\bar{6}$ 3485	6619
Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δ_0 - Δ_c
13.10	6	4505.003	+ 7.980	+ o oo3
15.02	limite	4504 898	7 ⁸ 7 ⁵	+ 0.005
30.47	0.5	4504.042	7.019	+ 0 005
32 56	0.5	4503.926	6.903	+ 0.005
37 48	o 5	4503.654	6 631	+ 0.005
40 32	0.5	4503 497 (2R)	6.474	+ 0 005
45.18	o 5	4503 228	6.205	+ 0.005
53.57	r.5	4502.764	5.741	+ 0.005
56 48	r.5	4502.603	5.580	+ 0.005
60.26	5	4502.388	5.365	+ 0.001
64 67	0.3	4502.157	5.134	+ 0.011
68.29	ĭ	4501 946	4.923	0.000
70.90	0.3	4501 813	4 79°	+ 0.011
77.29 est ^p	^{ee} 7	4561.448	4 425	+ 0 001
89.32	ó.5	4500 807	3.784	+ 0 020
91.82	o 5	4500 669	3 646	+ 0.021
94.28	4	4500.494 (2R)	3.471	0 018
116.00	3	4499 310	2 287	— o.oo7
120 56	3	4499.066	2.043	- 0.001
123 06	ī	4498 897	1.874	+ 0.002
131.60	1.5	4498.467	1.444	+ 0.007
142 79	1.5	4497.842	0 819	+ 0.004
157.79	7	4497.023		
170.79	2	4496.318	— o 705	+ 0.007
174 00	2	4496.125	o 898	- 0.010
181.39	I	4495.738	1.285	+ 0.007
183.79	I	4495.590	1.433	- 0 010
186.98	0.8	4495.426	1 . 597	+ 0 001
100.90				6

Positions. 191 43 199.56 est ^{pée} 208.39 218.86 233.89 240 95	Intensités 0 8 8 2 1 5 3 2	λ _R 4495.182 4494.738 (d) 4494.222 4493.695 4492.846 4492 475	$(\lambda - \lambda_0)_R$ 1.841 2.285 2.801 3.238 4.177 4.548	$\Delta_0 - \Delta_c$ + 0.001 0.000 - 0.043 + 0.011 - 0.025 - 0.006
257.70 268 98 272.99 281.86 288.25 299.29 303.90 314.44 317.89	6 0.3 5 5 4 2 3	4491.570 4490.958 (2R) 4490.740 (2R) 4490.253 4489.911 4489.307 (2R) 4489.075 4488.493 4488.305	5.453 6.065 6.283 6.770 7.112 7.716 7 948 8.530 8.718	0.000 + 0.001 - 0.005 0.000 - 0.004 + 0.001 - 0.001

PLANCHE XIV. — DESSIN Nº 28.

]	Log. A = $\bar{2}.727$	9502 <u>L</u>	og. $B = \bar{6}.3145$	5 ₇₉ 6
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	($\lambda - \lambda_0$) _R	Δ_{0} - Δ_{c}
- 2.11	3	4488.305	+ 8.530	0.000
+ 5.09	o 5	4488.034	8.259	- 0.001
9 37	o 3	4487.916	8.141	- 0.001
12.23	0.3	4487.685	7.910	- 0.001
14.27	0.3	4487.530	6. <i>7</i> 55	- 0.001
19 79	o 3	4487.420	6 645	- 0.001
37.97	0.3	4486 140	6.365	- 0.001
43.41	5 5	4485.846	6 071	0.000
70 64	6	4484.392	4.617	+ 0.012
95.80	o 3	4483.039	3 264	+ 0.012
98 00	4	4482.904	3 1 2 9	— 0.005
107 70	8	4482.388 (2R)	2.613	0 000
1 19.40	1	4481.782	2.007	+ 0.021
124.50	3	4481.476 (2R)	1 701	- 0.012
128.15	2.5	4481.298	1.523	+ 0.006
134.15	I	4480.990	1.215	+ 0.019
1 38.04	τ.5	4480.752	o 977	- 0.010
146.63	3	4480.308	o.533	+ 0.005

Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_0 - \Delta_0$
149.90	3	4480. 133	+ o.358	+ 0 003
156.50	4	4479 ·7 7 5		
160.66	0.3	4479.553	- 0.222	0.000
163.46	o 3	4479.404	o 371	100.0
186.23	o 5	4478.190	1.585	+ 0.002
204.28	0.5	4477.228	1.547	+ 0.001
223 20	8	4476 219 (2R)	3.556	- 0.002
237.32	0.5	4475.470	4.305	+ 0.001
245.50	0.8	4475.026	4.749	 0 008
247 84	0.8	4474.912	4.863	+ 0.002
261.00	0.3	4474.213	5.562	+ 0 001
265.69	0.3	4473.964 (2R)	5.811	+ 0.001
281.90	ĭ	4473.095	6 6 80	- 0 010
285 30	6	4472.925 (2R)	6 85 0	0 000
303.35	0.8	4471.971	7.804	+ 0.001
305.72	0.8	4471.846	7.929	+ 0 001
313.91	2	4471.408	8.367	— o oo5
321.40	3	4471 017	8. ₇ 58	+ 0.005

PLANCHE XV. - DESSIN Nº 29.

Log. A = $\frac{1}{2.7170070}$		$Log. B = \overline{6} 22032$	<u> 433</u>	
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λο) π	$\Delta_0 - \Delta_c$
1.40	3	4471.017	+ 9.199	+ 0.002
8.30	4	4470.648	8.830	- 0.003
15.00	3	4470.300	8.482	+ 0.002
29.32 estpee	7	4469 545	7 727	0 000
33 68	I	4469.316	7.508	+ 0 009
45.96	6	4468.663	6 845	- 0.006
58.84	0.3	4467.997	6.179	+ 0.004
64.09	0.3	4467.721	5.903	+ 0.004
68.33	0.3	4467.498	5.680	+ 0 003
	2.5	4467.102	5 284	— n.008
75.66	6.5	4466.727	4.909	- 0 001
82.94	0.5	4466.147	4.329	- 0.001
94.02	1	4465.975	4.157	+ 0.005
97.40	0.5	4465.775	3.95 ₇	- 0.001
101.12		4465.519	3.701	- 0.001
106.01	0.5	4465.106 (2 F		- 0.002
113.90	0.5		7	+ 0.002
118.05	6	4464.891 (2 F	5.075	•

Positions	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ - λ ₀) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
123.23	45	4464.617	+ 2.799	+ 0.002
143.31	3	4463.569	1.751	— 0 004
148.46	0.5	4463.300	1.482	0.000
1 61.57	4	4462.621	o 8o3	+ 0.005
166.36	o 3	4462 365	o 547	o.ooi
170.10	5	4462.165	0 347	— 0.006
176 87	4 5	4661 818		
181 68	ĭ	4461 568 (2R)	— o 25o	+ o.oo1
186 87 est ^{pée}	5	4461 303 (2R)	0.515	+ 0.006
193 69	o 5	4460.944	o 873	+ 0 003
198 38	0.5	4460.700	811.1	+ 0 002
202 80 estpte	6	4460.462 (3R)	1.356	 0.006
213.31	3	4459.922	1.896	+ 0.001
220.87	2	4459.525	2.293	<u> </u>
226.27	9	4459.250 (2R)	2 568	— 0.003
237.08	I	4458.690	3.128	+ 0.004
242.57	3	4458.4 09	3 .40 9	+ 0.008
245.78	3	4458 239	3 5 7 9	— 0.005
255.95	3	4457 712	4.106	+ 0.005
258.11	3	4457.600	4.218	+ o oo5
265.72	r.5	4457.207	4 611	+ 0.007
273.57	3	4456.794	5.024	+ 0.001
279.46	2	4456.497	5.321	+ 0.009
288.45	7	4456.022 (2R)	5. 796	- 0.001
299.04	4	4455.485	6.333	+ 0.010
304 39	2.5	4455 193	6.625	 0.006
309.35 est ^{pe}		4454 953	6.865	+ 0 011
316 87	5	4454.552	7.266	- 0 002
33o 45	3	4453 . 876	7 942	+ 0.013
337.19	4	4453.486	8.332	+ 0 019

PLANCHE XV. — DESSIN N° 30.

Lo	$\log A = 2.705$	8970 I	$\log B = 627488$	<u> 396</u>
Positions.	Intensités	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λ ₀) _R	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
10.45	3	4453.876		
17.19	4	4453.486	+ 8 758	0.000
23.42	3	4453.171	8.443	+ 0.005
27.91 dou	ble 1	4452.935 (2R)	8.207	0.000
30.89	1.5	4452 782	8.054	+ 0.001

				•
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
42.78	1.5	4452.171	+ 7.443	0.000
50 93	6	4451.752	7.024	0.000
63.80	3	445 r.087	6.359	- o.o1o
72.50	4	4450.654	5.926	+ 0 008
7 ⁵ 7 ²	2	4450.482	5 . 754	+ 0.001
98.54	4	4449.313	4.585	0.000
126.25 estpee		4447.892	3.164	— o.on5
137.80	3	4447.302	2.5 7 4	- 0.004
143.69	3	4447.008	2.280	0.000
152.38	0.5	4446 566	1.838	+ 0.001
166 57	0.5	4445 844	1.116	+ 0.003
170.56	2	4445.641	0 913	+ 0.002
188.49	2.5	4444 728		
191.68	1	4444.566	— 0.162	+ 0.004
195.25	1	4444 385	0.343	0 000
203 50	6.5	4443.976	0.752	+ 0.011
215 29	5	4443.365	ı.363	0.003
219.38	0.5	4443 161	1 567	- 0.001
222.50	3	4442 996	1.732	— 0.007
232.22	7	4442.510	2 218	0 000
244.80	5	4441.881	2.847	+ 0.008
257.04	2	4441.255	3.473	+ 0.001
259.10	2	4441.151	3.577	+ 0.001
262.30	2	4440 989	3.739	+ 0 001
269.30	2	4440.635	4.093	0.000
280.80	3	4440.054	4.674	0.000
285. 73	0.5	4439 806	4.922	0.000
291.39	0.8	4439.521	5.207	+ 0.001
295 14	0.8	4439.332	5.396	- 0.004
311.46	4	4438.510	6.218	+ 0.001
321.47	1.5	4438.006	6.722	+ 0.001
326.97	1.5	4437.729	6.999	0.000
339.23	6	4437.112	7.616	+ 0.001

PLANCHE XVI. — DESSIN N° 31.

Log. A = 2.6959121			Log. $B = 6.2237$	7200
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ-λο) κ	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
6.97	1.5	4437.729	_	
19.23	6	4437.112	+ 8.401	+ 0.002
31.11	3	4436.516	7.8o5	+ 0.003

Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
35 16	0.5	4436.313	+ 7.602	· + o.oo3
44 17	7	4435.851	7.140	+ 0.002
54.93	3	4435 321	6 610	+ 0.002
58.75 est ^{pèe}	6	4435.129	6.418	+ 0.001
69.21	I	4434.605	5.894	+ 0.001
71.23	I	4434 504	5. ₇ 93	+ 0.001
77·94	1.5	4434.168	5.457	0.000
81 93	4	4433.948	5.237	0.020
93.47	5	4433.390	4.679	- 0.001
106.48	3	4432.736	4.025	0.000
115.54	2	4432 330	3.619	+ 0.040
121.15	2	4432.009	3 298	0.000
130.85	1.5	4431.525	2 814	— 0.001
135.32	0.5	4431.302	2.591	- 0.001
142.80	0.5	4430.929	2.218	- 0.002
142.60	5	4430.785	2.074	- 0.002
	2	4430.356	1.645	- 0.001
154.44 173.36	0.3	4429 411 (2R)	o. 7 00	+ 0.001
	2.5	4428.711	,	
187.44	7	4427.482	- I. 22 9	+ 0.001
212.19	3	4427.266	1.445	+ 0.001
216.70 225.18	0.5	4426.839	1.872	+ 0.001
	1	4426 201	2.510	0.000
238.07	I	4426.121	2 590	+ 0.001
239.69	0.5	4425.827	2.884	- 0.001
245.63	5.5	4425.608	3.103	+ 0.001
250 06	0.5	4424.748	3.963	- 0.001
267.50		4424.4 ⁵ 7	4.254	- 0.002
273.40	1 3	4424 006	4.705	— 0 002
282.54	0.5	4423.430	5.281	- 0 002
294.22		4423.430	5.413	- 0.002
296 90	I .	4423.134	5.577	0.000
300 23	0.5		5.970	0.000
308.18	4.5	4422.741	6.607	- 0.002
321.14	1.5	4422.104	•	— 0.002 — 0.002
328.69	I	4421.733	6.978	0,002

PLANCHE XVI. — DESSIN N° 32.

L	og A $-\frac{7}{2.687}$	6279	Log. $B = \overline{6}_{473}$	5619
_				
Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_o - \Delta_c$
8 69	I	4421.733	-F 7·977	— o oo5
17.71	0.5	4421.290	7.534	0 000
27.08	0.5	4420.832	7.066	+ 0.007
34.88	2	4420 447	6 .6 91	+ 0.008
50 64	ı	4419.675	5 919	+ 0.026
61 25	0.8	4419.106	5 350	— o o 29
68.84	o 8	4418 734	4.978	— o o26
74.65	3	4418.499	4 743	<u> </u>
87 22	5	4417.884	4.128	+ 0 030
06.10	2	4417 450	3.694	+ 0 033
104 62	1.5	441G 985	3.229	— o o 15
111.74	2.5	4416 636	2 880	- 0 014
129.04	4	4415.722	1.966	— o n26
139.33 est	ne 9	4415 293	1.537	— 0.006
144.30	2	4415 047	1.291	- 0.004
151.23	o 3	4414.714	0.958	- 0.003
153.1.4	0.3	4414.621	o 865	— o oo3
157.93	0.5	4414.391	0.635	0.000
160.25	0.5	4414.278	0.522	- - 0.002
165.74	0.8	4414.011	0.255	+ o oo2
170 94	1	44 13.756	-	
174.98	0.5	4413.560	- 0.196	0 000
180.75	0.3	4413.280	0.476	+ 0.002
189.39	0.3	4412.861	0.895	+ o oo3
195.17	0.3	4412.581	1.175	+ 0.004
197.35	I	4412.415	1 341	— o o55
205.24	3	4412.092	1.664	+ 0.003
222.85	3	4411.240	2.516	+ 0 005
234 41	2 5	4410.683	3.073	+ 0 007
245.00	1	4410.168	3.588	+ 0.003
248 17	0.3	4410.015	3.741	⊦ o.oo3
254.8í	1.5	44 0 9.683	4.073	- 0.009
260.51	τ.5	4409.408	4.348	— o oog
263 00	0.3	4409.288	4.468	- 0.009
276.80	7	4408.633 (2R	5.123	0.000
282.40	3	4408.364	5.392	- 0.010
293.27	7	4407.840 (2R	5.916	- 0.002
301.77	0.3	4407.432	6.324	— 0 004
314.66	5	4406.810	6.946	— o oo7

PLANCHE XVII. — DESSIN Nº 33.

Log	$g. A = \overline{2.67}$	7 774º 9	Log. B = 6.2252	2007
Dasitrons	Intensités	\	()) .)	Δ. Δ.
Positions.	Intensités.	λ_{R}	$(\lambda - \lambda_0)_R$	Δο - Δο
- 5 34	5	4406.810	+ 6.875	+ 0.001
+ 4.88	0.5	4406.319	6.384	+ 0.001
13.69	0.5	4 405. 896	6.961	+ 0 002
28.37	I	4405.191	6.256	+ 0.001
33.83 estpee	10	4404.927 (e)	4.992	+ 0.001
44.16	1.5	4404 433	4.498	+ o.oo1
66.86	2	440 3.347	3.412	— 0.006
81.64	0.3	4402.640	2.705	+ 0.002
84.38	0.3	4402.509	2.574	+ 0.002
102.09	7	4401.661 (2R)	1.726	0.000
106.59	5	4401 456	1.521	+ 0.010
112 00	1.5	4401.183	1.248	— 0.005
115.54	I	4401.020	1.085	+ 0.001
121.30	2	4400.738	0.803	- 0.007
125.40	7	4400.555	0.620	+ 0.006
129.74	0.5	4400.343	0.408	0.000
138.30	7	4399 935		
141.65	0.5	4399 776	 0.159	+ 0 001
162.53	0.3	4398.784	1.151	- 0.001
165.33	0.3	4398.651	1.284	- 0.002
169.35	0.3	4398 460	1.475	- 0.002
172.00	0.3	4398.334	1.601	- 0 002
175.40	2	4398.178	1.757	+ 0.005
188.50	0.3	4397.550	2.385	+ 0.003
191.07	0.3	4397.428	2 507	100 0 -
193.64	0.3	4397.306	2.609	+ 0 001
197.45	1.5	4397.125	2.810	+ 0 001
211.26	0.5	4396.471	3.464	+ 0 001
215.55	o.5	4396.268 (2R)	3.667	+ 0.001
221.04	2	4396.008	3.927	+ 0 001
228.28	I	4395.665	4 270	+ 0.001
233.75	4	4395.413	4.522	+ 0.005
238.08	7	4395.201	4.734	+ 0.001
258.60	4	4394.225	5 710	
261.57	0.5	4394.093	5.842	-0.019
264.09	0.5	4393.974	5.961	+ 0.002
266 55	0.5	4393.858	6.077	+ 0.002
270.35	2	4393.686	6.249	+ 0.002
275 37	0.5	4393.442	6.493	+ 0.003
280.59	0.5	4393.196	6.739	
3		4-330	0.759	+ 0.002

Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	$(\lambda - \lambda_0)_R$	$\Delta_{\rm o}$ - $\Delta_{\rm c}$
290.30	2	4392 752	- 7.183	+ 0.016
300.80	1.5	4392 235	7.700	- 0.007
307.54 estpee	2.5	4391.924	8 01 1	- o oo i
323 70	7	4391.157 (2R)		

PLANCHE XVII. — DESSIN Nº 34.

Log. A = $\frac{1}{2}.6697619$			Log. B = $\overline{6}.0899086$	
Positions.	Intensités.	$\lambda_{\mathbf{R}}$	(λ – λ_0) $_{\mathbf{R}}$	Δ_0 - Δ_c
— 12.46 est ^{pée}	2.5	4391 924	+ 4.704	+ 0.002
+ 3.70	7	4391.157 (2R)	3.937	 0. 006
13.60	0.5	4390.699	3.479	+ 0 002
15.34	1.5	4390.617	3 . 397	+ o.oa6
17.91	0.5	4390 496	3.276	0.000
25.30	5	4390.149	2 929	0 000
29 97	0.5	4389.930	2.710	0.000
32 72	0.5	4389 801	2 581	0.000
35.70	1	4389.667	2.447	— o oo5
41.30	3	4389 413	2 193	+ 0015
49.19	0.5	4389.029	1 809	- 0.001
52.22	0.5	4 388.887	1 667	+ 0.004
58 95	6	4388.571	1.351	0.002
70.10	4	4388.057	0.83 ₇	+ 0016
, 76 26	0.8	4387.762	0.542	0.000
78 4 9	0.8	4387.658	0.438	0 000
80.59	0.8	4387 559	o 339	0 000
87.86	2.5	4387.220		
92.57	2	4387.007	- o 2 1 3	+ 0 007
100 60	I	4386.616	0 604	— 0.009
109.50	I	4386 221	0.999	+ 0.007
123.64	5	4385.548	1.692	<u> </u>
126.54	2	4385.406	1 814	 0 008
129.40	2	4385.286	1.934	+ 0 015
132.42	4	4385 144	2.076	+ 0.004
138.14	7	4384.873	2 347	+ 0 001
141 90	0.5	4384 698	2.522	+ 0.001
146 65	I	4384 477	2.743	+ 0 001
150.79	0.5	4384.284	2.936	+ 0.001
162.89 estpee	10	4383.720 (f)	3 500	- 0.001